

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 2 433 | 1 070 | 1 363 | 698 | 843 | 372 | 520 |
| | 55-59 ans | 2 305 | 1 013 | 1 292 | 329 | 365 | 684 | 927 |
| | 60-64 ans | 2 942 | 1 303 | 1 639 | 336 | 369 | 967 | 1 270 |
| | 65-69 ans | 3 086 | 1 373 | 1 713 | 247 | 287 | 1 126 | 1 426 |
| | 70-74 ans | 2 458 | 1 164 | 1 294 | 161 | 229 | 1 003 | 1 065 |
| | 50-74 ans | 13 224 | 5 923 | 7 301 | 1 771 | 2 093 | 4 152 | 5 208 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 117 | 52 | 65 | 30 | 43 | 22 | 22 |
| | 55-59 ans | 124 | 57 | 67 | 23 | 24 | 34 | 43 |
| | 60-64 ans | 132 | 66 | 66 | 24 | 17 | 42 | 49 |
| | 65-69 ans | 155 | 60 | 95 | 13 | 29 | 47 | 66 |
| | 70-74 ans | 159 | 66 | 93 | 11 | 17 | 55 | 76 |
| | 50-74 ans | 687 | 301 | 386 | 101 | 130 | 200 | 256 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 71 | 28 | 43 | 14 | 26 | 14 | 17 |
| | 55-59 ans | 71 | 34 | 37 | 11 | 7 | 23 | 30 |
| | 60-64 ans | 87 | 45 | 42 | 14 | 5 | 31 | 37 |
| | 65-69 ans | 95 | 38 | 57 | 8 | 14 | 30 | 43 |
| | 70-74 ans | 110 | 45 | 65 | 3 | 10 | 42 | 55 |
| | 50-74 ans | 434 | 190 | 244 | 50 | 62 | 140 | 182 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 46 | 24 | 22 | 16 | 17 | 8 | 5 |
| | 55-59 ans | 53 | 23 | 30 | 12 | 17 | 11 | 13 |
| | 60-64 ans | 45 | 21 | 24 | 10 | 12 | 11 | 12 |
| | 65-69 ans | 60 | 22 | 38 | 5 | 15 | 17 | 23 |
| | 70-74 ans | 49 | 21 | 28 | 8 | 7 | 13 | 21 |
| | 50-74 ans | 253 | 111 | 142 | 51 | 68 | 60 | 74 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 2 387 | 1 046 | 1 341 | 682 | 826 | 364 | 515 |
| | 55-59 ans | 2 252 | 990 | 1 262 | 317 | 348 | 673 | 914 |
| | 60-64 ans | 2 897 | 1 282 | 1 615 | 326 | 357 | 956 | 1 258 |
| | 65-69 ans | 3 026 | 1 351 | 1 675 | 242 | 272 | 1 109 | 1 403 |
| | 70-74 ans | 2 409 | 1 143 | 1 266 | 153 | 222 | 990 | 1 044 |
| | 50-74 ans | 12 971 | 5 812 | 7 159 | 1 720 | 2 025 | 4 092 | 5 134 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 31 | 11 | 20 | 9 | 11 | 2 | 9 |
| | 55-59 ans | 52 | 28 | 24 | 11 | 9 | 17 | 15 |
| | 60-64 ans | 62 | 26 | 36 | 6 | 10 | 20 | 26 |
| | 65-69 ans | 59 | 28 | 31 | 5 | 9 | 23 | 22 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 62 | 33 | 29 | 4 | 3 | 29 | 26 |
| | 50-74 ans | 266 | 126 | 140 | 35 | 42 | 91 | 98 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 31 | 11 | 20 | 9 | 11 | 2 | 9 |
| | 55-59 ans | 51 | 28 | 23 | 11 | 8 | 17 | 15 |
| | 60-64 ans | 62 | 26 | 36 | 6 | 10 | 20 | 26 |
| | 65-69 ans | 59 | 28 | 31 | 5 | 9 | 23 | 22 |
| | 70-74 ans | 61 | 32 | 29 | 4 | 3 | 28 | 26 |
| | 50-74 ans | 264 | 125 | 139 | 35 | 41 | 90 | 98 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 24 | 9 | 15 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| | 55-59 ans | 38 | 25 | 13 | 10 | 4 | 15 | 9 |
| | 60-64 ans | 55 | 23 | 32 | 4 | 9 | 19 | 23 |
| | 65-69 ans | 52 | 25 | 27 | 5 | 7 | 20 | 20 |
| | 70-74 ans | 53 | 26 | 27 | 3 | 2 | 23 | 25 |
| | 50-74 ans | 222 | 108 | 114 | 30 | 29 | 78 | 85 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 19 | 6 | 13 | 5 | 5 | 1 | 8 |
| | 55-59 ans | 28 | 20 | 8 | 8 | 3 | 12 | 5 |
| | 60-64 ans | 39 | 19 | 20 | 3 | 8 | 16 | 12 |
| | 65-69 ans | 43 | 23 | 20 | 4 | 6 | 19 | 14 |
| | 70-74 ans | 43 | 21 | 22 | 1 | 2 | 20 | 20 |
| | 50-74 ans | 172 | 89 | 83 | 21 | 24 | 68 | 59 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 24 | 9 | 15 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| | 55-59 ans | 38 | 25 | 13 | 10 | 4 | 15 | 9 |
| | 60-64 ans | 53 | 23 | 30 | 4 | 9 | 19 | 21 |
| | 65-69 ans | 52 | 25 | 27 | 5 | 7 | 20 | 20 |
| | 70-74 ans | 51 | 25 | 26 | 3 | 2 | 22 | 24 |
| | 50-74 ans | 218 | 107 | 111 | 30 | 29 | 77 | 82 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 22 | 8 | 14 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| | 55-59 ans | 37 | 25 | 12 | 10 | 3 | 15 | 9 |
| | 60-64 ans | 53 | 23 | 30 | 4 | 9 | 19 | 21 |
| | 65-69 ans | 52 | 25 | 27 | 5 | 7 | 20 | 20 |
| | 70-74 ans | 52 | 26 | 26 | 3 | 2 | 23 | 24 |
| | 50-74 ans | 216 | 107 | 109 | 29 | 27 | 78 | 82 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 25 | 9 | 16 | 8 | 8 | 1 | 8 |
| | 55-59 ans | 39 | 25 | 14 | 10 | 5 | 15 | 9 |
| | 60-64 ans | 55 | 23 | 32 | 4 | 9 | 19 | 23 |
| | 65-69 ans | 52 | 25 | 27 | 5 | 7 | 20 | 20 |
| | 70-74 ans | 53 | 26 | 27 | 3 | 2 | 23 | 25 |
| | 50-74 ans | 224 | 108 | 116 | 30 | 31 | 78 | 85 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 14 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| | 55-59 ans | 18 | 11 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 29 | 12 | 17 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| | 65-69 ans | 35 | 14 | 21 | 3 | 5 | 11 | 16 |
| | 70-74 ans | 26 | 12 | 14 | 1 | 0 | 11 | 14 |
| | 50-74 ans | 122 | 54 | 68 | 13 | 18 | 41 | 50 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 22 | 11 | 11 | 5 | 3 | 6 | 8 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 24 | 19 | 5 | 8 | 1 | 11 | 4 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 20 | 10 | 10 | 1 | 4 | 9 | 6 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 11 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| | 65-69 ans | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| | 70-74 ans | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| | 50-74 ans | 46 | 30 | 16 | 13 | 4 | 17 | 12 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 24 | 19 | 5 | 8 | 1 | 11 | 4 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 20 | 16 | 4 | 6 | 1 | 10 | 3 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| | 50-74 ans | 22 | 17 | 5 | 7 | 1 | 10 | 4 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 20 | 10 | 10 | 1 | 4 | 9 | 6 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 19 | 10 | 9 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|----------|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 50-74 ans | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 11 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| | 60-64 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| | 70-74 ans | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| | 50-74 ans | 37 | 17 | 20 | 5 | 10 | 12 | 10 |

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,3 | 5,1 | 5,9 | 4,2 |
| | 55-59 ans | 5,4 | 5,6 | 5,2 | 7 | 6,6 | 5 | 4,6 |
| | 60-64 ans | 4,5 | 5,1 | 4 | 7,1 | 4,6 | 4,3 | 3,9 |
| | 65-69 ans | 5 | 4,4 | 5,5 | 5,3 | 10,1 | 4,2 | 4,6 |
| | 70-74 ans | 6,5 | 5,7 | 7,2 | 6,8 | 7,4 | 5,5 | 7,1 |
| | 50-74 ans | 5,2 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 6,2 | 4,8 | 4,9 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 2,3 | 2 | 2,2 | 1 |
| | 55-59 ans | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 4,7 | 1,6 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 3 | 3,3 | 1,1 | 0,9 |
| | 65-69 ans | 1,9 | 1,6 | 2,2 | 2 | 5,2 | 1,5 | 1,6 |
| | 70-74 ans | 2 | 1,8 | 2,2 | 5 | 3,1 | 1,3 | 2 |
| | 50-74 ans | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,9 | 3,2 | 1,4 | 1,4 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 60,7 | 53,8 | 66,2 | 46,7 | 60,5 | 63,6 | 77,3 |
| | 55-59 ans | 57,3 | 59,6 | 55,2 | 47,8 | 29,2 | 67,6 | 69,8 |
| | 60-64 ans | 65,9 | 68,2 | 63,6 | 58,3 | 29,4 | 73,8 | 75,5 |
| | 65-69 ans | 61,3 | 63,3 | 60 | 61,5 | 48,3 | 63,8 | 65,2 |
| | 70-74 ans | 69,2 | 68,2 | 69,9 | 27,3 | 58,8 | 76,4 | 72,4 |
| | 50-74 ans | 63,2 | 63,1 | 63,2 | 49,5 | 47,7 | 70 | 71,1 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 3,5 | 2,6 | 2,5 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 2,1 | 2 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 2,1 | 2,1 |
| | 65-69 ans | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 3,3 | 2,1 | 1,6 |
| | 70-74 ans | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 1,4 | 2,9 | 2,5 |
| | 50-74 ans | 2,1 | 2,2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 1,9 |
| 50-74 ans ** | 2 | 2,1 | 1,9 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 98,1 | 100 | 95,8 | 100 | 88,9 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 98,4 | 97 | 100 | 100 | 100 | 96,6 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,2 | 99,2 | 99,3 | 100 | 97,6 | 98,9 | 100 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 77,4 | 81,8 | 75 | 88,9 | 63,6 | 50 | 88,9 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 74,5 | 89,3 | 56,5 | 90,9 | 50 | 88,2 | 60 |
| | 60-64 ans | 88,7 | 88,5 | 88,9 | 66,7 | 90 | 95 | 88,5 |
| | 65-69 ans | 88,1 | 89,3 | 87,1 | 100 | 77,8 | 87 | 90,9 |
| | 70-74 ans | 86,9 | 81,3 | 93,1 | 75 | 66,7 | 82,1 | 96,2 |
| | 50-74 ans | 84,1 | 86,4 | 82 | 85,7 | 70,7 | 86,7 | 86,7 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 79,2 | 66,7 | 86,7 | 62,5 | 71,4 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 73,7 | 80 | 61,5 | 80 | 75 | 80 | 55,6 |
| | 60-64 ans | 70,9 | 82,6 | 62,5 | 75 | 88,9 | 84,2 | 52,2 |
| | 65-69 ans | 82,7 | 92 | 74,1 | 80 | 85,7 | 95 | 70 |
| | 70-74 ans | 81,1 | 80,8 | 81,5 | 33,3 | 100 | 87 | 80 |
| | 50-74 ans | 77,5 | 82,4 | 72,8 | 70 | 82,8 | 87,2 | 69,4 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 91 | 84 | 96 | 89 | 121 | 46 | 74 |
| | 55-59 ans | 88 | 83 | 96 | 94 | 84 | 77 | 102 |
| | 60-64 ans | 72 | 75 | 69 | 133 | 71 | 63 | 68 |
| | 65-69 ans | 115 | 110 | 119 | 128 | 172 | 106 | 99 |
| | 70-74 ans | 82 | 96 | 68 | 50 | 62 | 102 | 69 |
| | 50-74 ans | 89 | 91 | 87 | 99 | 108 | 88 | 80 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 67,5 (41-112,5) | 78 (46-97) | 61 (32-128) | 84,5 (58-113,5) | 61 (28-144) | 46 (46-46) | 52 (35-99,5) |
| | 55-59 ans | 65,5 (39-98) | 66 (40-84) | 65 (29-107) | 49 (39-84) | 83 (53-114) | 68 (40-94) | 47 (29-107) |
| | 60-64 ans | 67,5 (42-98) | 68 (46-106) | 67 (37-95) | 126 (108-157) | 57 (51-81) | 58 (41-93) | 68 (36-95) |
| | 65-69 ans | 76 (48-115) | 79 (50-133) | 71 (48-108) | 80 (76-94) | 99 (71-351) | 70,5 (43-135) | 67 (40-107) |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 61 (42-87) | 62 (42-87) | 60 (46-97) | 50 (38-63) | 62 (51-73) | 69 (42-101) | 60 (46-97) |
| | 50-74 ans | 67,5 (42-100,5) | 69,5 (43,5-101) | 65,5 (39,5-99,5) | 77 (46-104) | 71 (54-108) | 65,5 (42-101) | 64 (36-97) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 19,4 | 18,2 | 20 | 11,1 | 27,3 | 50 | 11,1 |
| | 55-59 ans | 21,2 | 10,7 | 33,3 | 9,1 | 33,3 | 11,8 | 33,3 |
| | 60-64 ans | 9,7 | 11,5 | 8,3 | 33,3 | 10 | 5 | 7,7 |
| | 65-69 ans | 11,9 | 10,7 | 12,9 | 0 | 22,2 | 13 | 9,1 |
| | 70-74 ans | 11,3 | 18,2 | 3,4 | 25 | 33,3 | 17,2 | 0 |
| | 50-74 ans | 13,9 | 13,5 | 14,3 | 14,3 | 23,8 | 13,2 | 10,2 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 91,7 | 88,9 | 93,3 | 87,5 | 85,7 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 97,4 | 100 | 92,3 | 100 | 75 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 96,4 | 100 | 93,8 | 100 | 100 | 100 | 91,3 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 98,1 | 100 | 96,3 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| | 50-74 ans | 97,3 | 99,1 | 95,6 | 96,7 | 93,1 | 100 | 96,5 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 56 | 55,6 | 56,3 | 50 | 37,5 | 100 | 75 |
| | 55-59 ans | 46,2 | 44 | 50 | 20 | 80 | 60 | 33,3 |
| | 60-64 ans | 52,7 | 52,2 | 53,1 | 75 | 66,7 | 47,4 | 47,8 |
| | 65-69 ans | 67,3 | 56 | 77,8 | 60 | 71,4 | 55 | 80 |
| | 70-74 ans | 49,1 | 46,2 | 51,9 | 33,3 | 0 | 47,8 | 56 |
| | 50-74 ans | 54,5 | 50 | 58,6 | 43,3 | 58,1 | 52,6 | 58,8 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 4 | 0 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
| | 55-59 ans | 5,1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 6,7 | 0 |
| | 60-64 ans | 9,1 | 13 | 6,3 | 0 | 11,1 | 15,8 | 4,3 |
| | 65-69 ans | 1,9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | 70-74 ans | 3,8 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | 50-74 ans | 4,9 | 5,6 | 4,3 | 3,3 | 3,2 | 6,4 | 4,7 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1,9 | 0 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 50-74 ans | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 3,3 | 0 | 0 | 1,2 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 4 | 0 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
| | 55-59 ans | 12,8 | 12 | 14,3 | 20 | 0 | 6,7 | 22,2 |
| | 60-64 ans | 10,9 | 8,7 | 12,5 | 25 | 22,2 | 5,3 | 8,7 |
| | 65-69 ans | 11,5 | 12 | 11,1 | 20 | 14,3 | 10 | 10 |
| | 70-74 ans | 7,5 | 11,5 | 3,7 | 33,3 | 0 | 8,7 | 4 |
| | 50-74 ans | 9,8 | 10,2 | 9,5 | 16,7 | 9,7 | 7,7 | 9,4 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 8 | 22,2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 15,4 | 20 | 7,1 | 40 | 0 | 6,7 | 11,1 |
| | 60-64 ans | 7,3 | 13 | 3,1 | 0 | 0 | 15,8 | 4,3 |
| | 65-69 ans | 7,7 | 16 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 |
| | 70-74 ans | 15,1 | 19,2 | 11,1 | 33,3 | 50 | 17,4 | 8 |
| | 50-74 ans | 10,7 | 17,6 | 4,3 | 26,7 | 3,2 | 14,1 | 4,7 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 16 | 11,1 | 18,8 | 12,5 | 37,5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5,1 | 4 | 7,1 | 0 | 0 | 6,7 | 11,1 |
| | 60-64 ans | 9,1 | 8,7 | 9,4 | 0 | 0 | 10,5 | 13 |
| | 65-69 ans | 5,8 | 8 | 3,7 | 0 | 14,3 | 10 | 0 |
| | 70-74 ans | 11,3 | 15,4 | 7,4 | 0 | 0 | 17,4 | 8 |
| | 50-74 ans | 8,9 | 9,3 | 8,6 | 3,3 | 12,9 | 11,5 | 7,1 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,8 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,4 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 10,3 | 8 | 14,3 | 0 | 0 | 13,3 | 22,2 |
| | 60-64 ans | 5,5 | 4,3 | 6,3 | 0 | 0 | 5,3 | 8,7 |
| | 65-69 ans | 3,8 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | 70-74 ans | 5,7 | 0 | 11,1 | 0 | 50 | 0 | 8 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 5,4 | 2,8 | 7,8 | 0 | 3,2 | 3,8 | 9,4 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 12 | 11,1 | 12,5 | 12,5 | 25 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,6 | 0 | 7,1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,8 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2,2 | 0,9 | 3,4 | 3,3 | 9,7 | 0 | 1,2 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,3 | 1,9 | 0,7 | 2,9 | 0 | 0 | 1,9 |
| | 55-59 ans | 4,9 | 8,1 | 2,4 | 18,9 | 0 | 3 | 3,3 |
| | 60-64 ans | 3,5 | 3,9 | 3,1 | 3,1 | 5,6 | 4,2 | 2,4 |
| | 65-69 ans | 3,3 | 5,2 | 1,8 | 8,3 | 3,7 | 4,5 | 1,4 |
| | 70-74 ans | 5 | 7 | 3,2 | 13,1 | 4,5 | 6,1 | 2,9 |
| | 50-74 ans | 3,5 | 5,2 | 2,2 | 7,6 | 2 | 4,2 | 2,3 |
| | 50-74 ans ** | 3,5 | 5 | 2,2 | - | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1,9 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,7 | 5,1 | 0,8 | 12,6 | 0 | 1,5 | 1,1 |
| | 60-64 ans | 1,4 | 2,3 | 0,6 | 0 | 0 | 3,1 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 1,3 | 3 | 0 | 4,1 | 0 | 2,7 | 0 |
| | 70-74 ans | 3,3 | 4,4 | 2,4 | 6,5 | 4,5 | 4 | 1,9 |
| | 50-74 ans | 1,9 | 3,3 | 0,7 | 4,7 | 0,5 | 2,7 | 0,8 |
| | 50-74 ans ** | 1,9 | 3,3 | 0,7 | - | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1,9 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 4 | 0,8 | 9,5 | 0 | 1,5 | 1,1 |
| | 60-64 ans | 1 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 2,2 | 0 | 4,1 | 0 | 1,8 | 0 |
| | 70-74 ans | 2,9 | 3,5 | 2,4 | 0 | 4,5 | 4 | 1,9 |
| | 50-74 ans | 1,5 | 2,8 | 0,6 | 3,5 | 0,5 | 2,4 | 0,6 |
| | 50-74 ans ** | 1,6 | 2,8 | 0,6 | - | - | - | - |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1,9 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,7 | 5,1 | 0,8 | 12,6 | 0 | 1,5 | 1,1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 1 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 2,2 | 0 | 4,1 | 0 | 1,8 | 0 |
| | 70-74 ans | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 0 | 4,5 | 4 | 2,9 |
| | 50-74 ans | 1,7 | 2,9 | 0,7 | 4,1 | 0,5 | 2,4 | 0,8 |
| | 50-74 ans ** | 1,8 | 3 | 0,7 | - | - | - | - |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,7 | 1 | 2,2 | 1,5 | 3,6 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,9 | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 1,5 | 1,1 |
| | 60-64 ans | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 0 | 0 | 2,1 | 2,4 |
| | 65-69 ans | 1 | 1,5 | 0,6 | 0 | 3,7 | 1,8 | 0 |
| | 70-74 ans | 2,5 | 3,5 | 1,6 | 0 | 0 | 4 | 1,9 |
| | 50-74 ans | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 0,6 | 2 | 2,2 | 1,2 |
| | 50-74 ans ** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 66,7 | 100 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 33,3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | 70-74 ans | 66,7 | 75 | 50 | 0 | 0 | 75 | 50 |
| | 50-74 ans | 42,1 | 60 | 22,2 | 100 | 33,3 | 55,6 | 16,7 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)