

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/6

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,4	4,5	4,2	5	4,7	3,8	3,7
	55-59 ans	3,8	4,3	3,5	7,2	4,5	3,8	3,3
	60-64 ans	3,7	3,6	3,8	6,8	5,9	3,1	3,5
	65-69 ans	3,1	3,1	3	4,9	4,7	2,9	2,9
	70-74 ans	4,9	4,8	5	9	8,9	4,3	4,6
	50-74 ans	3,9	4	3,8	5,7	5,1	3,5	3,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,2	1,9	1,7	0,5	0,7
	55-59 ans	1	0,9	1,1	2,7	1,9	0,6	1
	60-64 ans	1	1	1	2,6	3,3	0,7	0,8
	65-69 ans	0,6	0,7	0,6	1,9	1,9	0,5	0,5
	70-74 ans	1,2	1,1	1,2	3,7	3	0,8	1
	50-74 ans	1	1	1	2,2	2	0,6	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,1	70,8	71,4	62,5	64,7	85,9	81,7
	55-59 ans	73,4	79	67,8	62,3	57,9	84,5	69,9
	60-64 ans	72,5	73,1	72,1	62,5	44,7	76,5	78,2
	65-69 ans	79	78	79,8	62,5	60,7	81	83,2
	70-74 ans	76,5	77	76,1	59,3	65,7	80,6	78,2
	50-74 ans	74	75,2	73,1	62,2	60,6	81,4	77,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,4	1,5	1,3	1,7	1,4	1,3	1
	55-59 ans	1,7	1,6	1,7	2,1	2,2	1,5	1,7
	60-64 ans	1,7	2	1,4	2,3	1,8	1,9	1,4
	65-69 ans	1,9	2,4	1,5	2,7	1,9	2,4	1,5
	70-74 ans	2,4	2,8	2	4,9	2,3	2,6	2
	50-74 ans	1,8	2	1,6	2,1	1,7	2	1,5
50-74 ans **	1,7	1,9	1,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97	96,6	97,5	98,2	98	93,8	96,8
	55-59 ans	99,5	98,7	100	100	100	98,4	100
	60-64 ans	98,1	98,1	98	100	92,9	97,8	98,8
	65-69 ans	97,6	95,7	100	84,6	100	97,1	100
	70-74 ans	97,7	98,9	96,3	100	100	98,7	95,9
	50-74 ans	98	97,5	98,5	97,4	98	97,6	98,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,9	94,1	93,7	92,7	93,9	96,7	93,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	96,7	97,4	96,2	93,3	94,4	98,4	96,6
	60-64 ans	93,1	93,4	92,7	87,5	92,3	94,4	92,8
	65-69 ans	95,6	95,5	95,6	90,9	100	96	95
	70-74 ans	90,6	92,3	88,6	100	88,9	90,9	88,6
	50-74 ans	94	94,5	93,6	92,8	94	95	93,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,2	93,8	94,6	94,1	97,8	93,1	89,3
	55-59 ans	94,3	97,3	92,1	92,9	94,1	98,3	91,7
	60-64 ans	96,3	94,9	97,8	92,9	100	95,3	97,4
	65-69 ans	94,3	96,3	92	100	90,9	95,9	92,1
	70-74 ans	94,8	95,2	94,3	100	100	94,3	93,5
	50-74 ans	94,8	95,5	94,1	95,1	96,8	95,6	93,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85	86	83	95	94	71	65
	55-59 ans	84	81	87	64	75	84	89
	60-64 ans	78	81	76	57	83	85	74
	65-69 ans	86	89	82	174	65	80	85
	70-74 ans	89	87	91	102	62	84	95
	50-74 ans	84	85	84	94	83	82	84
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57 (36-92)	60,5 (40-93)	55 (34-92)	68 (41-109)	52,5 (32-105)	57 (37-82)	62 (41-88)
	55-59 ans	60 (42-88)	63 (42-87)	58 (43-91)	53 (39-68)	70 (47-97)	65 (42-87)	57 (43-91)
	60-64 ans	56 (40-86)	57 (44-89)	55,5 (36-84)	55,5 (44-59)	73,5 (34-95)	57 (44-92)	51 (36,5-79,5)
	65-69 ans	60,5 (42-92)	59 (42-92)	64 (40-91)	102,5 (50-140)	64 (46-86)	58 (42-91)	63 (39-94,5)
	70-74 ans	59 (39-102)	59 (40-96)	58 (37-106)	64 (42-102)	57 (31,5-92)	58 (39-90)	61 (39-107)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/6

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	58 (40-91)	59 (42-91)	57 (37-91)	59 (42-102)	57 (34-97)	58,5 (42-89,5)	58 (38-91)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,7	3,4	6,2	3,6	6	3,1	6,5
	55-59 ans	2,2	2,6	1,9	6,7	0	1,6	2,3
	60-64 ans	1,9	0,9	3,1	0	7,1	1,1	2,4
	65-69 ans	1,9	1,7	2,2	7,7	0	1	2,5
	70-74 ans	5,7	6,5	4,9	0	11,1	7,7	4,1
	50-74 ans	3,2	2,9	3,5	3,5	4,9	2,7	3,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	100	98,6	100	100	100	96,4
	55-59 ans	98,9	98,6	99	100	94,1	98,3	100
	60-64 ans	99,5	99	100	100	100	98,8	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,4	98,8	100	100	100	98,6	100
	50-74 ans	99,4	99,3	99,5	100	98,9	99,1	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59	46,9	72	53,8	70,2	34,5	75
	55-59 ans	58,9	51,4	64,4	42,9	52,9	53,3	66,7
	60-64 ans	47,9	42,4	53,9	42,9	25	42,4	58,4
	65-69 ans	50,3	42,7	59,8	54,5	63,6	41,4	59,2
	70-74 ans	48,7	42,9	55,6	21,4	12,5	47,1	60,9
	50-74 ans	52,8	44,9	61,1	46,7	55,8	44,3	62,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,1	2,5	8	1,9	10,6	3,4	3,6
	55-59 ans	6,9	4,1	8,9	0	5,9	5	9,5
	60-64 ans	3,7	2	5,6	0	0	2,4	6,5
	65-69 ans	4,6	1,8	8	0	0	2	9,2
	70-74 ans	3,8	6	1,4	7,1	0	5,7	1,6
	50-74 ans	4,8	3,1	6,6	1,9	6,3	3,5	6,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,1	1,4	1	0	5,9	1,7	0
	60-64 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,2	0,5	0	1,1	0,3	0,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/6

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,1	6,2	8	5,8	6,4	6,9	10,7
	55-59 ans	6,9	9,5	5	7,1	5,9	10	4,8
	60-64 ans	10,1	13,1	6,7	7,1	0	14,1	7,8
	65-69 ans	12,2	14,5	9,2	18,2	18,2	14,1	7,9
	70-74 ans	13,5	13,1	13,9	7,1	25	14,3	12,5
	50-74 ans	10	11,6	8,3	7,6	8,4	12,8	8,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,2	35,8	5,3	32,7	8,5	41,4	0
	55-59 ans	16	24,3	9,9	28,6	11,8	23,3	9,5
	60-64 ans	26,1	29,3	22,5	21,4	66,7	30,6	15,6
	65-69 ans	20,3	24,5	14,9	9,1	9,1	26,3	15,8
	70-74 ans	17,3	21,4	12,5	28,6	25	20	10,9
	50-74 ans	20,3	27	13,2	27,6	17,9	26,8	11,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	6,2	1,3	1,9	0	13,8	3,6
	55-59 ans	4,6	5,4	4	21,4	0	1,7	4,8
	60-64 ans	8,5	8,1	9	14,3	8,3	7,1	9,1
	65-69 ans	10,7	13,6	6,9	18,2	9,1	13,1	6,6
	70-74 ans	12,8	11,9	13,9	28,6	37,5	8,6	10,9
	50-74 ans	8,1	9,4	6,8	11,4	5,3	8,7	7,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	0	2,7	0	2,1	0	3,6
	55-59 ans	1,7	1,4	2	0	0	1,7	2,4
	60-64 ans	2,1	3	1,1	7,1	0	2,4	1,3
	65-69 ans	0,5	0,9	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1,3	2,4	0	7,1	0	1,4	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/6

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1,4	1,6	1,2	1,9	1,1	1,5	1,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,3	1,2	1,3	1,9	0	0	3,6
	55-59 ans	1,1	1,4	1	0	5,9	1,7	0
	60-64 ans	0,5	1	0	0	0	1,2	0
	65-69 ans	0,5	0,9	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0,6	1,2	0	0	0	1,4	0
	50-74 ans	0,8	1,1	0,5	1	1,1	1,2	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	6	1,6	6,1	2	5,9	1
	55-59 ans	3,6	5,1	2,5	7	3,6	4,7	2,3
	60-64 ans	5,5	7,7	3,8	5,8	10,4	8	3
	65-69 ans	5,9	8,8	3,5	6,3	5,2	9,1	3,3
	70-74 ans	6,5	8,7	4,7	17,4	10,4	7,9	4,1
	50-74 ans	4,9	7,1	3,1	6,8	4,1	7,2	2,8
	50-74 ans **	4,9	6,9	3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	5,1	0,6	5,2	1,2	5	0
	55-59 ans	2,5	3,6	1,6	5,6	2,4	3,3	1,5
	60-64 ans	4	5,3	2,9	4,4	10,4	5,5	2
	65-69 ans	3,7	5,6	2,2	2,1	1,7	5,9	2,2
	70-74 ans	3,7	5,4	2,2	13,9	5,2	4,6	1,9
	50-74 ans	3,3	5	1,9	5,3	2,8	4,9	1,7
	50-74 ans **	3,3	4,9	1,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	4,6	0,6	4,9	1,2	4,2	0
	55-59 ans	2,2	3,2	1,3	4,2	2,4	3,1	1,1
	60-64 ans	3,6	4,6	2,8	4,4	9,1	4,6	2
	65-69 ans	3,5	5,3	2	2,1	1,7	5,7	2
	70-74 ans	3	5,1	1,2	13,9	2,6	4,3	1,1
	50-74 ans	2,9	4,5	1,6	4,9	2,5	4,4	1,4
	50-74 ans **	2,9	4,4	1,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	5,1	0,6	5,2	1,2	5	0
	55-59 ans	2,4	3,2	1,6	4,2	2,4	3,1	1,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/6

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,8	5,1	2,8	4,4	9,1	5,2	2
	65-69 ans	3,7	5,6	2,2	2,1	1,7	5,9	2,2
	70-74 ans	3,7	6,3	1,5	17,4	2,6	5,2	1,4
	50-74 ans	3,2	5	1,8	5,3	2,5	4,9	1,6
	50-74 ans **	3,2	4,9	1,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,9	0,2	0,3	0	1,7	0,3
	55-59 ans	0,7	0,8	0,7	4,2	0	0,2	0,8
	60-64 ans	1,3	1,5	1,2	2,9	1,3	1,3	1,2
	65-69 ans	1,9	3,1	1	4,2	1,7	3	0,9
	70-74 ans	2,7	3	2,5	13,9	7,8	2	1,9
	50-74 ans	1,3	1,7	1	2,2	0,8	1,6	1
	50-74 ans **	1,3	1,6	1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	16,7	0	100	0	0	0	100
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	14,3	14,3	14,3	0	0	16,7	16,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4,9	2,8	8	0	0	3,8	10

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)