

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 38 - Isère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	27 905	13 201	14 704	7 769	8 198	5 432	6 506
	55-59 ans	24 729	11 290	13 439	1 242	1 406	10 048	12 033
	60-64 ans	25 494	11 379	14 115	998	1 055	10 381	13 060
	65-69 ans	22 439	10 044	12 395	680	588	9 364	11 807
	70-74 ans	16 951	7 678	9 273	432	357	7 246	8 916
	50-74 ans	117 518	53 592	63 926	11 121	11 604	42 471	52 322
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	479	223	256	141	159	82	97
	55-59 ans	424	189	235	43	42	146	193
	60-64 ans	509	215	294	29	37	186	257
	65-69 ans	446	187	259	27	27	160	232
	70-74 ans	423	184	239	25	19	159	220
	50-74 ans	2 281	998	1 283	265	284	733	999
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	372	182	190	106	112	76	78
	55-59 ans	337	153	184	29	24	124	160
	60-64 ans	409	172	237	15	18	157	219
	65-69 ans	356	150	206	13	15	137	191
	70-74 ans	334	144	190	15	11	129	179
	50-74 ans	1 808	801	1 007	178	180	623	827
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	107	41	66	35	47	6	19
	55-59 ans	87	36	51	14	18	22	33
	60-64 ans	100	43	57	14	19	29	38
	65-69 ans	90	37	53	14	12	23	41
	70-74 ans	89	40	49	10	8	30	41
	50-74 ans	473	197	276	87	104	110	172
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	27 798	13 160	14 638	7 734	8 151	5 426	6 487
	55-59 ans	24 642	11 254	13 388	1 228	1 388	10 026	12 000
	60-64 ans	25 394	11 336	14 058	984	1 036	10 352	13 022
	65-69 ans	22 349	10 007	12 342	666	576	9 341	11 766
	70-74 ans	16 862	7 638	9 224	422	349	7 216	8 875
	50-74 ans	117 045	53 395	63 650	11 034	11 500	42 361	52 150
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	359	192	167	121	91	71	76
	55-59 ans	363	187	176	23	19	164	157
	60-64 ans	443	213	230	27	23	186	207
	65-69 ans	377	194	183	17	12	177	171
	70-74 ans	314	160	154	8	6	152	148

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 38 - Isère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 856	946	910	196	151	750	759
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	355	190	165	120	90	70	75
	55-59 ans	353	180	173	23	19	157	154
	60-64 ans	430	204	226	26	21	178	205
	65-69 ans	365	189	176	15	12	174	164
	70-74 ans	297	151	146	8	6	143	140
	50-74 ans	1 800	914	886	192	148	722	738
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	324	174	150	110	79	64	71
	55-59 ans	330	167	163	21	17	146	146
	60-64 ans	398	186	212	23	19	163	193
	65-69 ans	348	181	167	14	11	167	156
	70-74 ans	279	141	138	7	6	134	132
	50-74 ans	1 679	849	830	175	132	674	698
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	316	173	143	109	77	64	66
	55-59 ans	314	155	159	20	16	135	143
	60-64 ans	382	179	203	23	18	156	185
	65-69 ans	336	176	160	13	11	163	149
	70-74 ans	263	134	129	6	6	128	123
	50-74 ans	1 611	817	794	171	128	646	666
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	5	0	0	0	5	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	9	2	1	1	8	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	322	174	148	110	78	64	70

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 38 - Isère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	326	164	162	21	17	143	145
	60-64 ans	392	183	209	23	19	160	190
	65-69 ans	342	178	164	14	11	164	153
	70-74 ans	275	140	135	7	6	133	129
	50-74 ans	1 657	839	818	175	131	664	687
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	22	10	12	0	1	10	11
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	324	174	150	110	79	64	71
	55-59 ans	326	164	162	21	17	143	145
	60-64 ans	397	185	212	23	19	162	193
	65-69 ans	347	181	166	14	11	167	155
	70-74 ans	276	140	136	7	6	133	130
	50-74 ans	1 670	844	826	175	132	669	694
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	324	174	150	110	79	64	71
	55-59 ans	332	168	164	21	17	147	147
	60-64 ans	398	186	212	23	19	163	193
	65-69 ans	349	182	167	14	11	168	156
	70-74 ans	280	141	139	7	6	134	133
	50-74 ans	1 683	851	832	175	132	676	700
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	191	86	105	53	52	33	53
	55-59 ans	175	75	100	8	11	67	89
	60-64 ans	207	76	131	12	9	64	122
	65-69 ans	154	65	89	1	4	64	85
	70-74 ans	120	54	66	3	2	51	64

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 38 - Isère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	847	356	491	77	78	279	413
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	26	16	10	11	7	5	3
	55-59 ans	38	21	17	1	0	20	17
	60-64 ans	46	25	21	2	1	23	20
	65-69 ans	28	13	15	1	0	12	15
	70-74 ans	26	14	12	1	0	13	12
	50-74 ans	164	89	75	16	8	73	67
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	43	27	16	18	11	9	5
	55-59 ans	54	29	25	3	3	26	22
	60-64 ans	54	35	19	3	4	32	15
	65-69 ans	56	33	23	5	0	28	23
	70-74 ans	41	24	17	1	1	23	16
	50-74 ans	248	148	100	30	19	118	81
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	51	35	16	21	7	14	9
	55-59 ans	53	36	17	8	3	28	14
	60-64 ans	64	33	31	3	3	30	28
	65-69 ans	73	45	28	4	4	41	24
	70-74 ans	65	38	27	0	1	38	26
	50-74 ans	306	187	119	36	18	151	101
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	12	9	3	6	2	3	1
	55-59 ans	10	5	5	1	0	4	5
	60-64 ans	26	16	10	3	2	13	8
	65-69 ans	34	24	10	3	3	21	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 38 - Isère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	26	10	16	2	1	8	15
	50-74 ans	108	64	44	15	8	49	36
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	94	62	32	39	18	23	14
	55-59 ans	107	65	42	11	6	54	36
	60-64 ans	118	68	50	6	7	62	43
	65-69 ans	129	78	51	9	4	69	47
	70-74 ans	106	62	44	1	2	61	42
	50-74 ans	554	335	219	66	37	269	182
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	51	35	16	21	7	14	9
	55-59 ans	53	36	17	8	3	28	14
	60-64 ans	64	33	31	3	3	30	28
	65-69 ans	73	45	28	4	4	41	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 38 - Isère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	65	38	27	0	1	38	26
	50-74 ans	306	187	119	36	18	151	101
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	41	30	11	20	7	10	4
	55-59 ans	35	27	8	7	1	20	7
	60-64 ans	49	24	25	3	3	21	22
	65-69 ans	51	30	21	3	3	27	18
	70-74 ans	46	27	19	0	1	27	18
	50-74 ans	222	138	84	33	15	105	69
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	46	34	12	22	7	12	5
	55-59 ans	48	35	13	8	2	27	11
	60-64 ans	57	30	27	3	4	27	23
	65-69 ans	65	42	23	5	3	37	20
	70-74 ans	63	40	23	0	1	40	22
	50-74 ans	279	181	98	38	17	143	81
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	9	3	6	2	3	1
	55-59 ans	10	5	5	1	0	4	5
	60-64 ans	26	16	10	3	2	13	8
	65-69 ans	34	24	10	3	3	21	7
	70-74 ans	26	10	16	2	1	8	15
	50-74 ans	108	64	44	15	8	49	36
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	7	3	5	2	2	1
	55-59 ans	8	3	5	1	0	2	5
	60-64 ans	26	16	10	3	2	13	8
	65-69 ans	29	21	8	3	2	18	6
	70-74 ans	23	8	15	2	1	6	14
	50-74 ans	96	55	41	14	7	41	34
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 38 - Isère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1
	55-59 ans	8	3	5	1	0	2	5
	60-64 ans	26	16	10	3	2	13	8
	65-69 ans	29	21	8	3	2	18	6
	70-74 ans	23	8	15	2	1	6	14
	50-74 ans	95	54	41	14	7	40	34
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	7	3	4	1	0	2	4
	60-64 ans	20	11	9	2	2	9	7
	65-69 ans	26	18	8	2	2	16	6
	70-74 ans	17	5	12	2	1	3	11
	50-74 ans	74	40	34	10	5	30	29
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	21	14	7	4	2	10	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	1	3	0	2	1	1
	65-69 ans	13	9	4	0	2	9	2
	70-74 ans	5	0	5	0	1	0	4
	50-74 ans	27	13	14	2	5	11	9
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	16	9	7	1	0	8	7
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 38 - Isère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	16	9	7	3	0	6	7
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	6	3	3	2	0	1	3
	50-74 ans	15	9	6	4	0	5	6
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1
	55-59 ans	8	3	5	1	0	2	5
	60-64 ans	24	15	9	3	2	12	7
	65-69 ans	25	18	7	2	2	16	5
	70-74 ans	18	5	13	0	1	5	12
	50-74 ans	84	47	37	11	7	36	30
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	10	6	9	4	1	2
	55-59 ans	13	7	6	2	2	5	4
	60-64 ans	13	9	4	3	1	6	3
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
	50-74 ans	55	33	22	16	8	17	14

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 38 - Isère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	1,7	1,7	1,7	1,8	1,9	1,5	1,5
	55-59 ans	1,7	1,7	1,7	3,5	3	1,5	1,6
	60-64 ans	2	1,9	2,1	2,9	3,5	1,8	2
	65-69 ans	2	1,9	2,1	4	4,6	1,7	2
	70-74 ans	2,5	2,4	2,6	5,8	5,3	2,2	2,5
	50-74 ans	1,9	1,9	2	2,4	2,4	1,7	1,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,4	0,3	0,4	0,5	0,6	0,1	0,3
	55-59 ans	0,4	0,3	0,4	1,1	1,3	0,2	0,3
	60-64 ans	0,4	0,4	0,4	1,4	1,8	0,3	0,3
	65-69 ans	0,4	0,4	0,4	2,1	2	0,2	0,3
	70-74 ans	0,5	0,5	0,5	2,3	2,2	0,4	0,5
	50-74 ans	0,4	0,4	0,4	0,8	0,9	0,3	0,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,7	81,6	74,2	75,2	70,4	92,7	80,4
	55-59 ans	79,5	81	78,3	67,4	57,1	84,9	82,9
	60-64 ans	80,4	80	80,6	51,7	48,6	84,4	85,2
	65-69 ans	79,8	80,2	79,5	48,1	55,6	85,6	82,3
	70-74 ans	79	78,3	79,5	60	57,9	81,1	81,4
	50-74 ans	79,3	80,3	78,5	67,2	63,4	85	82,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,5	1,1	1,6	1,1	1,3	1,2
	55-59 ans	1,5	1,7	1,3	1,9	1,4	1,6	1,3
	60-64 ans	1,7	1,9	1,6	2,7	2,2	1,8	1,6
	65-69 ans	1,7	1,9	1,5	2,6	2,1	1,9	1,5
	70-74 ans	1,9	2,1	1,7	1,9	1,7	2,1	1,7
	50-74 ans	1,6	1,8	1,4	1,8	1,3	1,8	1,5
50-74 ans **	1,6	1,8	1,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	99	98,8	99,2	98,9	98,6	98,7
	55-59 ans	97,2	96,3	98,3	100	100	95,7	98,1
	60-64 ans	97,1	95,8	98,3	96,3	91,3	95,7	99
	65-69 ans	96,8	97,4	96,2	88,2	100	98,3	95,9
	70-74 ans	94,6	94,4	94,8	100	100	94,1	94,6
	50-74 ans	97	96,6	97,4	98	98	96,3	97,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,3	91,6	90,9	91,7	87,8	91,4	94,7
	55-59 ans	93,5	92,8	94,2	91,3	89,5	93	94,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 38 - Isère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,6	91,2	93,8	88,5	90,5	91,6	94,1
	65-69 ans	95,3	95,8	94,9	93,3	91,7	96	95,1
	70-74 ans	93,9	93,4	94,5	87,5	100	93,7	94,3
	50-74 ans	93,3	92,9	93,7	91,1	89,2	93,4	94,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,5	99,4	95,3	99,1	97,5	100	93
	55-59 ans	95,2	92,8	97,5	95,2	94,1	92,5	97,9
	60-64 ans	96	96,2	95,8	100	94,7	95,7	95,9
	65-69 ans	96,6	97,2	95,8	92,9	100	97,6	95,5
	70-74 ans	94,3	95	93,5	85,7	100	95,5	93,2
	50-74 ans	95,9	96,2	95,7	97,7	97	95,8	95,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	55-59 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	60-64 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	65-69 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	50-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	101	104	97	106	107	99	86
	55-59 ans	98	105	91	85	134	108	86
	60-64 ans	91	105	80	100	69	106	81
	65-69 ans	101	102	99	76	58	104	102
	70-74 ans	90	93	87	166	42	89	89
	50-74 ans	96	102	90	103	98	102	89
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57 (37-96)	57,5 (40-95)	57 (34-102)	56,5 (37-96)	63 (40-120)	59,5 (43-94,5)	54 (30-75)
	55-59 ans	55,5 (37-88)	58 (39-89)	52 (34-88)	61 (40-106)	61 (47-99)	58 (39-88)	51,5 (34-87)
	60-64 ans	55 (37-81)	58 (38-88)	53 (35-79)	41 (33-88)	66 (37-93)	59 (39-91)	53 (35-78)
	65-69 ans	57 (37-90)	57 (37-85)	53 (37-97)	54 (43-64)	64 (43-78)	58 (36-86)	52,5 (37-101)
	70-74 ans	50 (36-83)	52 (34-89)	50 (37-72)	43 (29-331)	43 (32-50)	54 (36-87)	50 (37-75)
	50-74 ans	56 (37-88)	58 (38-89)	53 (36-85)	56 (36-96)	60 (40-100,5)	58 (39-88)	52 (35-84)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,5	5,2	3,6	7,4	4,4	1,4	2,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 38 - Isère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,6	3,7	3,4	8,7	10,5	3	2,5
	60-64 ans	2,9	4,2	1,7	11,1	4,3	3,2	1,4
	65-69 ans	1,3	1,5	1,1	5,9	8,3	1,1	0,6
	70-74 ans	2,5	2,5	2,6	12,5	0	2	2,7
	50-74 ans	3	3,5	2,4	8,2	5,3	2,3	1,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,8	98,2	99,4	100	100	97,9	99,3
	60-64 ans	99,7	99,5	100	100	100	99,4	100
	65-69 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	99,4
	70-74 ans	98,9	99,3	98,6	100	100	99,3	98,5
	50-74 ans	99,5	99,4	99,5	100	100	99,3	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59	49,4	70	48,2	65,8	51,6	74,6
	55-59 ans	52,7	44,6	61	38,1	64,7	45,6	60,5
	60-64 ans	52	40,9	61,8	52,2	47,4	39,3	63,2
	65-69 ans	44,1	35,7	53,3	7,1	36,4	38,1	54,5
	70-74 ans	42,9	38,3	47,5	42,9	33,3	38,1	48,1
	50-74 ans	50,3	41,8	59	44	59,1	41,3	59
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8	9,2	6,7	10	8,9	7,8	4,2
	55-59 ans	11,4	12,5	10,4	4,8	0	13,6	11,6
	60-64 ans	11,6	13,4	9,9	8,7	5,3	14,1	10,4
	65-69 ans	8	7,1	9	7,1	0	7,1	9,6
	70-74 ans	9,3	9,9	8,6	14,3	0	9,7	9
	50-74 ans	9,7	10,5	9	9,1	6,1	10,8	9,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,3	15,5	10,7	16,4	13,9	14,1	7
	55-59 ans	16,3	17,3	15,2	14,3	17,6	17,7	15
	60-64 ans	13,6	18,8	9	13	21,1	19,6	7,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 38 - Isère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	16	18,1	13,8	35,7	0	16,7	14,7
	70-74 ans	14,6	17	12,2	14,3	16,7	17,2	12
	50-74 ans	14,7	17,4	12	17,1	14,4	17,5	11,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,7	20,1	10,7	19,1	8,9	21,9	12,7
	55-59 ans	16	21,4	10,4	38,1	17,6	19	9,5
	60-64 ans	16,1	17,7	14,6	13	15,8	18,4	14,5
	65-69 ans	20,9	24,7	16,8	28,6	36,4	24,4	15,4
	70-74 ans	23,2	27	19,4	0	16,7	28,4	19,5
	50-74 ans	18,2	22	14,3	20,6	13,6	22,3	14,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	5,2	2	5,5	2,5	4,7	1,4
	55-59 ans	3	3	3	4,8	0	2,7	3,4
	60-64 ans	6,5	8,6	4,7	13	10,5	8	4,1
	65-69 ans	9,7	13,2	6	21,4	27,3	12,5	4,5
	70-74 ans	9,3	7,1	11,5	28,6	16,7	6	11,3
	50-74 ans	6,4	7,5	5,3	8,6	6,1	7,2	5,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,3	0,6	0	0,9	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,6	0
	65-69 ans	0,9	1,1	0,6	0	0	1,2	0,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0,1	0,6	0	0,4	0,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	1,2	0	0	0	1,4	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 38 - Isère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,7	0,7	0,7	0	16,7	0,7	0
	50-74 ans	0,3	0,4	0,2	0	0,8	0,4	0,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	4,7	2,2	5	2,2	4,2	2,2
	55-59 ans	4,3	5,8	3,1	9	4,3	5,4	3
	60-64 ans	4,6	6	3,6	6,1	6,8	6	3,3
	65-69 ans	5,8	7,8	4,1	13,5	6,9	7,4	4
	70-74 ans	6,3	8,1	4,8	2,4	5,7	8,5	4,7
	50-74 ans	4,7	6,3	3,4	6	3,2	6,4	3,5
	50-74 ans **	4,7	6,2	3,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,7	1,1	2,7	0,9	2,6	1,4
	55-59 ans	2,2	3,2	1,3	6,5	2,2	2,8	1,2
	60-64 ans	2,5	2,9	2,2	3	2,9	2,9	2,2
	65-69 ans	3,3	4,5	2,3	6	6,9	4,4	2
	70-74 ans	3,9	5	2,9	0	2,9	5,3	2,9
	50-74 ans	2,6	3,5	1,9	3,3	1,6	3,6	1,9
	50-74 ans **	2,6	3,4	1,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,3	0,8	2,6	0,9	1,8	0,6
	55-59 ans	1,4	2,4	0,6	5,7	0,7	2	0,6
	60-64 ans	1,9	2,1	1,8	3	2,9	2	1,7
	65-69 ans	2,3	3	1,7	4,5	5,2	2,9	1,5
	70-74 ans	2,7	3,5	2,1	0	2,9	3,7	2
	50-74 ans	1,9	2,6	1,3	3	1,3	2,5	1,3
	50-74 ans **	1,9	2,5	1,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,6	0,8	2,8	0,9	2,2	0,8
	55-59 ans	1,9	3,1	1	6,5	1,4	2,7	0,9
	60-64 ans	2,2	2,6	1,9	3	3,9	2,6	1,8
	65-69 ans	2,9	4,2	1,9	7,5	5,2	4	1,7
	70-74 ans	3,7	5,2	2,5	0	2,9	5,5	2,5
	50-74 ans	2,4	3,4	1,5	3,4	1,5	3,4	1,6
	50-74 ans **	2,4	3,3	1,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,7	0,2	0,8	0,2	0,6	0,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 38 - Isère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,4	0,4	0,4	0,8	0	0,4	0,4
	60-64 ans	1	1,4	0,7	3	1,9	1,3	0,6
	65-69 ans	1,5	2,4	0,8	4,5	5,2	2,2	0,6
	70-74 ans	1,5	1,3	1,7	4,7	2,9	1,1	1,7
	50-74 ans	0,9	1,2	0,7	1,4	0,7	1,2	0,7
	50-74 ans **	0,9	1,1	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)