

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	24 811	12 072	12 739	7 586	7 906	4 486	4 833
	55-59 ans	23 273	10 925	12 348	1 605	1 739	9 320	10 609
	60-64 ans	22 970	10 686	12 284	1 442	1 497	9 244	10 787
	65-69 ans	17 441	8 189	9 252	986	1 041	7 203	8 211
	70-74 ans	14 206	6 525	7 681	747	900	5 778	6 781
	50-74 ans	102 701	48 397	54 304	12 366	13 083	36 031	41 221
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 318	649	669	431	472	218	197
	55-59 ans	1 298	612	686	131	158	481	528
	60-64 ans	1 247	598	649	125	126	473	523
	65-69 ans	1 024	511	513	87	68	424	445
	70-74 ans	973	425	548	78	101	347	447
	50-74 ans	5 860	2 795	3 065	852	925	1 943	2 140
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	814	417	397	258	257	159	140
	55-59 ans	831	389	442	64	70	325	372
	60-64 ans	847	413	434	66	59	347	375
	65-69 ans	704	354	350	42	29	312	321
	70-74 ans	681	301	380	42	60	259	320
	50-74 ans	3 877	1 874	2 003	472	475	1 402	1 528
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	504	232	272	173	215	59	57
	55-59 ans	467	223	244	67	88	156	156
	60-64 ans	400	185	215	59	67	126	148
	65-69 ans	320	157	163	45	39	112	124
	70-74 ans	292	124	168	36	41	88	127
	50-74 ans	1 983	921	1 062	380	450	541	612
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	24 307	11 840	12 467	7 413	7 691	4 427	4 776
	55-59 ans	22 806	10 702	12 104	1 538	1 651	9 164	10 453
	60-64 ans	22 570	10 501	12 069	1 383	1 430	9 118	10 639
	65-69 ans	17 121	8 032	9 089	941	1 002	7 091	8 087
	70-74 ans	13 914	6 401	7 513	711	859	5 690	6 654
	50-74 ans	100 718	47 476	53 242	11 986	12 633	35 490	40 609
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	454	279	175	189	111	90	64
	55-59 ans	475	251	224	48	37	203	187
	60-64 ans	506	287	219	45	35	242	184
	65-69 ans	452	253	199	32	16	221	183
	70-74 ans	400	238	162	34	22	204	140

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2 287	1 308	979	348	221	960	758
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	451	277	174	187	110	90	64
	55-59 ans	465	247	218	48	35	199	183
	60-64 ans	495	281	214	44	34	237	180
	65-69 ans	440	246	194	30	16	216	178
	70-74 ans	387	229	158	34	21	195	137
	50-74 ans	2 238	1 280	958	343	216	937	742
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	417	255	162	174	102	81	60
	55-59 ans	439	239	200	48	33	191	167
	60-64 ans	456	261	195	41	29	220	166
	65-69 ans	415	230	185	26	13	204	172
	70-74 ans	356	215	141	33	18	182	123
	50-74 ans	2 083	1 200	883	322	195	878	688
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	407	249	158	171	99	78	59
	55-59 ans	430	234	196	47	31	187	165
	60-64 ans	437	250	187	38	27	212	160
	65-69 ans	406	224	182	25	12	199	170
	70-74 ans	348	210	138	32	18	178	120
	50-74 ans	2 028	1 167	861	313	187	854	674
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	7	6	1	2	1	4	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	7	6	1	2	1	4	0
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	26	21	5	5	2	16	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	412	253	159	173	101	80	58
	55-59 ans	437	238	199	48	33	190	166

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	450	258	192	40	28	218	164
	65-69 ans	407	226	181	26	12	200	169
	70-74 ans	351	212	139	31	18	181	121
	50-74 ans	2 057	1 187	870	318	192	869	678
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	8	4	4	0	1	4	3
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	50-74 ans	26	13	13	4	3	9	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	9	4	5	1	1	3	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	417	255	162	174	102	81	60
	55-59 ans	439	239	200	48	33	191	167
	60-64 ans	456	261	195	41	29	220	166
	65-69 ans	415	230	185	26	13	204	172
	70-74 ans	356	215	141	33	18	182	123
	50-74 ans	2 083	1 200	883	322	195	878	688
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	418	256	162	175	102	81	60
	55-59 ans	440	239	201	48	33	191	168
	60-64 ans	459	263	196	41	29	222	167
	65-69 ans	417	230	187	26	13	204	174
	70-74 ans	358	216	142	33	19	183	123
	50-74 ans	2 092	1 204	888	323	196	881	692
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	227	119	108	81	68	38	40
	55-59 ans	203	89	114	17	20	72	94
	60-64 ans	222	104	118	13	18	91	100
	65-69 ans	165	69	96	11	6	58	90
	70-74 ans	126	60	66	14	9	46	57
	50-74 ans	943	441	502	136	121	305	381

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	31	23	8	17	5	6	3
	55-59 ans	32	15	17	4	3	11	14
	60-64 ans	29	16	13	3	1	13	12
	65-69 ans	32	20	12	1	0	19	12
	70-74 ans	29	19	10	4	0	15	10
	50-74 ans	153	93	60	29	9	64	51
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	60	41	19	28	13	13	6
	55-59 ans	74	41	33	8	5	33	28
	60-64 ans	68	48	20	7	4	41	16
	65-69 ans	77	46	31	1	2	45	29
	70-74 ans	68	43	25	5	2	38	23
	50-74 ans	347	219	128	49	26	170	102
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	72	54	18	34	10	20	8
	55-59 ans	87	64	23	13	4	51	19
	60-64 ans	93	63	30	8	3	55	27
	65-69 ans	93	63	30	9	3	54	27
	70-74 ans	75	57	18	4	3	53	15
	50-74 ans	420	301	119	68	23	233	96
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	16	14	2	11	2	3	0
	55-59 ans	31	22	9	6	1	16	8
	60-64 ans	38	27	11	8	2	19	9
	65-69 ans	37	26	11	4	2	22	9
	70-74 ans	49	31	18	6	5	25	13
	50-74 ans	171	120	51	35	12	85	39

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	7	4	3	3	1	1	2
	55-59 ans	12	7	5	0	0	7	5
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	39	22	17	3	2	19	15
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	6	2	4	0	0	2	4
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	15	6	9	2	2	4	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	132	95	37	62	23	33	14
	55-59 ans	161	105	56	21	9	84	47
	60-64 ans	161	111	50	15	7	96	43
	65-69 ans	170	109	61	10	5	99	56
	70-74 ans	143	100	43	9	5	91	38
	50-74 ans	767	520	247	117	49	403	198
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	72	54	18	34	10	20	8
	55-59 ans	87	64	23	13	4	51	19
	60-64 ans	93	63	30	8	3	55	27
	65-69 ans	93	63	30	9	3	54	27
	70-74 ans	75	57	18	4	3	53	15
	50-74 ans	420	301	119	68	23	233	96

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	66	51	15	31	10	20	5
	55-59 ans	77	56	21	11	4	45	17
	60-64 ans	78	53	25	8	3	45	22
	65-69 ans	80	56	24	9	3	47	21
	70-74 ans	63	46	17	3	3	43	14
	50-74 ans	364	262	102	62	23	200	79
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	73	57	16	36	10	21	6
	55-59 ans	86	63	23	13	4	50	19
	60-64 ans	93	66	27	9	4	57	23
	65-69 ans	93	63	30	9	4	54	26
	70-74 ans	80	60	20	6	3	54	17
	50-74 ans	425	309	116	73	25	236	91
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	16	14	2	11	2	3	0
	55-59 ans	31	22	9	6	1	16	8
	60-64 ans	38	27	11	8	2	19	9
	65-69 ans	37	26	11	4	2	22	9
	70-74 ans	49	31	18	6	5	25	13
	50-74 ans	171	120	51	35	12	85	39
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	15	13	2	10	2	3	0
	55-59 ans	26	18	8	5	1	13	7
	60-64 ans	34	25	9	8	2	17	7
	65-69 ans	31	23	8	4	1	19	7
	70-74 ans	43	25	18	3	5	22	13
	50-74 ans	149	104	45	30	11	74	34
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	15	13	2	10	2	3	0
	55-59 ans	26	18	8	5	1	13	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	33	24	9	8	2	16	7
	65-69 ans	31	23	8	4	1	19	7
	70-74 ans	43	25	18	3	5	22	13
	50-74 ans	148	103	45	30	11	73	34
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	11	10	1	7	1	3	0
	55-59 ans	19	11	8	3	1	8	7
	60-64 ans	29	20	9	7	2	13	7
	65-69 ans	23	16	7	3	1	13	6
	70-74 ans	37	21	16	3	3	18	13
	50-74 ans	119	78	41	23	8	55	33
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	7	7	0	2	0	5	0
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	8	7	1	1	0	6	1
	70-74 ans	6	4	2	0	2	4	0
	50-74 ans	29	25	4	7	3	18	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	8	8	0	6	0	2	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	9	7	2	0	1	7	1
	65-69 ans	8	6	2	0	0	6	2
	70-74 ans	12	8	4	2	0	6	4
	50-74 ans	39	30	9	9	1	21	8
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	9	4	5	1	1	3	4
	65-69 ans	4	4	0	2	0	2	0
	70-74 ans	12	6	6	1	3	5	3
	50-74 ans	31	18	13	6	5	12	8
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	9	5	4	0	0	5	4
	60-64 ans	7	5	2	3	0	2	2
	65-69 ans	10	5	5	1	1	4	4
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	50-74 ans	38	21	17	4	2	17	15
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	4	0	3	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	11	9	2	4	0	5	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	15	13	2	10	2	3	0
	55-59 ans	26	18	8	5	1	13	7
	60-64 ans	32	23	9	6	2	17	7
	65-69 ans	30	22	8	4	1	18	7
	70-74 ans	41	24	17	3	5	21	12
	50-74 ans	144	100	44	28	11	72	33
A40- Perdus de vue	50-54 ans	25	16	9	10	6	6	3
	55-59 ans	16	7	9	0	1	7	8
	60-64 ans	29	16	13	3	4	13	9
	65-69 ans	17	10	7	3	3	7	4
	70-74 ans	23	10	13	0	2	10	11
	50-74 ans	110	59	51	16	16	43	35

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,3	5,4	5,3	5,7	6	4,9	4,1
	55-59 ans	5,6	5,6	5,6	8,2	9,1	5,2	5
	60-64 ans	5,4	5,6	5,3	8,7	8,4	5,1	4,8
	65-69 ans	5,9	6,2	5,5	8,8	6,5	5,9	5,4
	70-74 ans	6,8	6,5	7,1	10,4	11,2	6	6,6
	50-74 ans	5,7	5,8	5,6	6,9	7,1	5,4	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	1,9	2,1	2,3	2,7	1,3	1,2
	55-59 ans	2	2	2	4,2	5,1	1,7	1,5
	60-64 ans	1,7	1,7	1,8	4,1	4,5	1,4	1,4
	65-69 ans	1,8	1,9	1,8	4,6	3,7	1,6	1,5
	70-74 ans	2,1	1,9	2,2	4,8	4,6	1,5	1,9
	50-74 ans	1,9	1,9	2	3,1	3,4	1,5	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61,8	64,3	59,3	59,9	54,4	72,9	71,1
	55-59 ans	64	63,6	64,4	48,9	44,3	67,6	70,5
	60-64 ans	67,9	69,1	66,9	52,8	46,8	73,4	71,7
	65-69 ans	68,8	69,3	68,2	48,3	42,6	73,6	72,1
	70-74 ans	70	70,8	69,3	53,8	59,4	74,6	71,6
	50-74 ans	66,2	67	65,4	55,4	51,4	72,2	71,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,4	1,4	2,5	1,4	2	1,3
	55-59 ans	2,1	2,3	1,9	3,1	2,2	2,2	1,8
	60-64 ans	2,2	2,7	1,8	3,3	2,4	2,7	1,7
	65-69 ans	2,6	3,1	2,2	3,4	1,6	3,1	2,3
	70-74 ans	2,9	3,7	2,2	4,8	2,6	3,6	2,1
	50-74 ans	2,3	2,8	1,8	2,9	1,7	2,7	1,9
50-74 ans **	2,3	2,7	1,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	99,3	99,4	98,9	99,1	100	100
	55-59 ans	97,9	98,4	97,3	100	94,6	98	97,9
	60-64 ans	97,8	97,9	97,7	97,8	97,1	97,9	97,8
	65-69 ans	97,3	97,2	97,5	93,8	100	97,7	97,3
	70-74 ans	96,8	96,2	97,5	100	95,5	95,6	97,9
	50-74 ans	97,9	97,9	97,9	98,6	97,7	97,6	97,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,5	92,1	93,1	93	92,7	90	93,8
	55-59 ans	94,4	96,8	91,7	100	94,3	96	91,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,1	92,9	91,1	93,2	85,3	92,8	92,2
	65-69 ans	94,3	93,5	95,4	86,7	81,3	94,4	96,6
	70-74 ans	92	93,9	89,2	97,1	85,7	93,3	89,8
	50-74 ans	93,1	93,8	92,2	93,9	90,3	93,7	92,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,6	97,6	97,5	98,3	97,1	96,3	98,3
	55-59 ans	97,9	97,9	98	97,9	93,9	97,9	98,8
	60-64 ans	95,8	95,8	95,9	92,7	93,1	96,4	96,4
	65-69 ans	97,8	97,4	98,4	96,2	92,3	97,5	98,8
	70-74 ans	97,8	97,7	97,9	97	100	97,8	97,6
	50-74 ans	97,4	97,3	97,5	97,2	95,9	97,3	98
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	111	114	106	116	114	111	93
	55-59 ans	87	88	86	92	66	87	90
	60-64 ans	86	88	82	100	69	86	85
	65-69 ans	90	94	85	64	54	98	87
	70-74 ans	90	91	88	108	99	88	86
	50-74 ans	93	95	89	105	94	92	88
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	65 (43-109)	71 (45-117)	61,5 (39-98)	69,5 (45-115)	61,5 (41-109)	71 (49-123)	59,5 (38-87,5)
	55-59 ans	56 (40-92)	58 (41-93)	56 (38-91)	53,5 (35,5-104)	59 (36-94)	58 (42-92)	53 (38-91)
	60-64 ans	60 (42-86,5)	63 (42-87)	57 (41-84)	63 (45-88)	64 (49-85)	62,5 (42-87)	57 (41-83)
	65-69 ans	59 (36-97)	60 (37-106)	56 (36-87)	51,5 (29-64)	43 (21-71)	62 (38,5-110)	56,5 (36-91)
	70-74 ans	59 (37-90,5)	57 (35-91)	62 (41-87)	55 (39-81)	69,5 (47-90)	58,5 (35-92)	60 (41-87)
	50-74 ans	60 (40-94)	62 (41-100)	57 (38-90)	62 (41-105)	62 (39-94)	62 (41-97)	57 (38-88)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,5	5,7	5,1	5,3	5,4	6,7	4,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,4	2,8	4	0	2,7	3,4	4,3
	60-64 ans	5,7	5,6	5,9	6,7	11,4	5,4	4,9
	65-69 ans	3,8	4	3,5	9,4	18,8	3,2	2,2
	70-74 ans	5,8	4,2	8	0	9,1	4,9	7,9
	50-74 ans	4,8	4,5	5,2	4,6	7,2	4,5	4,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,3	46,5	66,7	46,3	66,7	46,9	66,7
	55-59 ans	46,1	37,2	56,7	35,4	60,6	37,7	56
	60-64 ans	48,4	39,5	60,2	31,7	62,1	41	59,9
	65-69 ans	39,6	30	51,3	42,3	46,2	28,4	51,7
	70-74 ans	35,2	27,8	46,5	42,4	47,4	25,1	46,3
	50-74 ans	45,1	36,6	56,5	42,1	61,7	34,6	55,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,4	9	4,9	9,7	4,9	7,4	5
	55-59 ans	7,3	6,3	8,5	8,3	9,1	5,8	8,3
	60-64 ans	6,3	6,1	6,6	7,3	3,4	5,9	7,2
	65-69 ans	7,7	8,7	6,4	3,8	0	9,3	6,9
	70-74 ans	8,1	8,8	7	12,1	0	8,2	8,1
	50-74 ans	7,3	7,7	6,8	9	4,6	7,3	7,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,4	0	0,6	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,2	0	0,5	0	0	0	0,6
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,5	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0,1	0,3	0	0,1	0,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,4	16	11,7	16	12,7	16	10
	55-59 ans	16,8	17,2	16,4	16,7	15,2	17,3	16,7
	60-64 ans	14,8	18,3	10,2	17,1	13,8	18,5	9,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	18,5	20	16,6	3,8	15,4	22,1	16,7
	70-74 ans	19	19,9	17,6	15,2	10,5	20,8	18,7
	50-74 ans	16,6	18,2	14,4	15,2	13,3	19,3	14,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,2	21,1	11,1	19,4	9,8	24,7	13,3
	55-59 ans	19,8	26,8	11,4	27,1	12,1	26,7	11,3
	60-64 ans	20,3	24	15,3	19,5	10,3	24,8	16,2
	65-69 ans	22,3	27,4	16	34,6	23,1	26,5	15,5
	70-74 ans	20,9	26,4	12,7	12,1	15,8	29	12,2
	50-74 ans	20,1	25	13,4	21,1	11,7	26,4	13,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	5,5	1,2	6,3	2	3,7	0
	55-59 ans	7	9,2	4,5	12,5	3	8,4	4,8
	60-64 ans	8,3	10,3	5,6	19,5	6,9	8,6	5,4
	65-69 ans	8,9	11,3	5,9	15,4	15,4	10,8	5,2
	70-74 ans	13,7	14,4	12,7	18,2	26,3	13,7	10,6
	50-74 ans	8,2	10	5,7	10,8	6,1	9,6	5,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,7	1,6	1,9	1,7	1	1,2	3,3
	55-59 ans	2,7	2,9	2,5	0	0	3,7	3
	60-64 ans	1,3	1,1	1,5	0	3,4	1,4	1,2
	65-69 ans	1,7	1,7	1,6	0	0	2	1,7
	70-74 ans	2	1,9	2,1	0	0	2,2	2,4
	50-74 ans	1,9	1,8	1,9	0,9	1	2,2	2,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0	1,9	0	2	0	1,7
	55-59 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,5	0
	60-64 ans	0,4	0,8	0	4,9	0	0	0
	65-69 ans	1,4	0,9	2,1	0	0	1	2,3
	70-74 ans	0,8	0,5	1,4	0	0	0,5	1,6
	50-74 ans	0,7	0,5	1	0,6	1	0,5	1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,4	8	3	8,4	3	7,5	2,9
	55-59 ans	7,1	9,8	4,6	13,7	5,5	9,2	4,5
	60-64 ans	7,1	10,6	4,1	10,8	4,9	10,5	4
	65-69 ans	9,9	13,6	6,7	10,6	5	14	6,9
	70-74 ans	10,3	15,6	5,7	12,7	5,8	16	5,7
	50-74 ans	7,6	11	4,6	9,8	3,9	11,4	4,9
	50-74 ans **	7,6	10,9	4,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,6	1,4	4,6	1,3	4,5	1,7
	55-59 ans	3,8	6	1,9	8,5	2,4	5,6	1,8
	60-64 ans	4,1	6	2,5	5,8	2,1	6	2,5
	65-69 ans	5,4	7,8	3,3	9,6	3	7,6	3,3
	70-74 ans	5,4	8,9	2,4	5,6	3,5	9,3	2,3
	50-74 ans	4,2	6,3	2,2	5,7	1,8	6,6	2,4
	50-74 ans **	4,2	6,3	2,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4,3	1,2	4,2	1,3	4,5	1
	55-59 ans	3,4	5,2	1,7	7,2	2,4	4,9	1,6
	60-64 ans	3,5	5	2,1	5,8	2,1	4,9	2,1
	65-69 ans	4,7	7	2,6	9,6	3	6,6	2,6
	70-74 ans	4,5	7,2	2,3	4,2	3,5	7,6	2,1
	50-74 ans	3,6	5,5	1,9	5,2	1,8	5,6	1,9
	50-74 ans **	3,6	5,5	1,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,8	1,3	4,9	1,3	4,7	1,3
	55-59 ans	3,8	5,9	1,9	8,5	2,4	5,5	1,8
	60-64 ans	4,1	6,3	2,2	6,5	2,8	6,3	2,2
	65-69 ans	5,4	7,8	3,3	9,6	4	7,6	3,2
	70-74 ans	5,7	9,4	2,7	8,4	3,5	9,5	2,6
	50-74 ans	4,2	6,5	2,2	6,1	2	6,6	2,2
	50-74 ans **	4,2	6,5	2,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,2	0,2	1,5	0,3	0,7	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,4	2,1	0,7	3,9	0,6	1,7	0,8
	60-64 ans	1,7	2,6	0,9	5,8	1,4	2,1	0,8
	65-69 ans	2,2	3,2	1,2	4,3	2	3,1	1,1
	70-74 ans	3,5	4,8	2,4	8,4	5,8	4,4	2
	50-74 ans	1,7	2,5	1	2,9	0,9	2,4	1
	50-74 ans **	1,7	2,5	1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,9	4	0	0	0	5,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,7	1	0	0	0	1,4	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)