

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 954	3 156	3 798	1 591	1 839	1 565	1 959
	55-59 ans	6 362	2 848	3 514	349	349	2 499	3 165
	60-64 ans	7 535	3 298	4 237	359	332	2 939	3 905
	65-69 ans	7 144	3 235	3 909	240	232	2 995	3 677
	70-74 ans	4 883	2 228	2 655	129	159	2 099	2 496
	<b>50-74 ans</b>	<b>32 878</b>	<b>14 765</b>	<b>18 113</b>	<b>2 668</b>	<b>2 911</b>	<b>12 097</b>	<b>15 202</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	283	128	155	67	75	61	80
	55-59 ans	321	152	169	30	32	122	137
	60-64 ans	329	147	182	31	22	116	160
	65-69 ans	313	132	181	11	14	121	167
	70-74 ans	292	122	170	10	17	112	153
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 538</b>	<b>681</b>	<b>857</b>	<b>149</b>	<b>160</b>	<b>532</b>	<b>697</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	201	93	108	44	46	49	62
	55-59 ans	240	111	129	14	15	97	114
	60-64 ans	259	112	147	15	15	97	132
	65-69 ans	250	106	144	8	10	98	134
	70-74 ans	232	99	133	5	9	94	124
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 182</b>	<b>521</b>	<b>661</b>	<b>86</b>	<b>95</b>	<b>435</b>	<b>566</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	82	35	47	23	29	12	18
	55-59 ans	81	41	40	16	17	25	23
	60-64 ans	70	35	35	16	7	19	28
	65-69 ans	63	26	37	3	4	23	33
	70-74 ans	60	23	37	5	8	18	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>356</b>	<b>160</b>	<b>196</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>97</b>	<b>131</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 872	3 121	3 751	1 568	1 810	1 553	1 941
	55-59 ans	6 281	2 807	3 474	333	332	2 474	3 142
	60-64 ans	7 465	3 263	4 202	343	325	2 920	3 877
	65-69 ans	7 081	3 209	3 872	237	228	2 972	3 644
	70-74 ans	4 823	2 205	2 618	124	151	2 081	2 467
	<b>50-74 ans</b>	<b>32 522</b>	<b>14 605</b>	<b>17 917</b>	<b>2 605</b>	<b>2 846</b>	<b>12 000</b>	<b>15 071</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	115	66	49	32	25	34	24
	55-59 ans	106	66	40	9	3	57	37
	60-64 ans	136	70	66	16	6	54	60
	65-69 ans	165	76	89	11	8	65	81

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	126	70	56	2	5	68	51
	<b>50-74 ans</b>	<b>648</b>	<b>348</b>	<b>300</b>	<b>70</b>	<b>47</b>	<b>278</b>	<b>253</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	114	65	49	31	25	34	24
	55-59 ans	106	66	40	9	3	57	37
	60-64 ans	136	70	66	16	6	54	60
	65-69 ans	165	76	89	11	8	65	81
	70-74 ans	125	69	56	2	5	67	51
	<b>50-74 ans</b>	<b>646</b>	<b>346</b>	<b>300</b>	<b>69</b>	<b>47</b>	<b>277</b>	<b>253</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	107	60	47	28	24	32	23
	55-59 ans	98	62	36	7	2	55	34
	60-64 ans	124	62	62	15	6	47	56
	65-69 ans	143	63	80	7	6	56	74
	70-74 ans	114	63	51	2	4	61	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>586</b>	<b>310</b>	<b>276</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>251</b>	<b>234</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	103	58	45	27	23	31	22
	55-59 ans	97	61	36	7	2	54	34
	60-64 ans	123	61	62	15	6	46	56
	65-69 ans	139	60	79	6	6	54	73
	70-74 ans	112	61	51	2	4	59	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>574</b>	<b>301</b>	<b>273</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>244</b>	<b>232</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	107	60	47	28	24	32	23
	55-59 ans	98	62	36	7	2	55	34
	60-64 ans	124	62	62	15	6	47	56
	65-69 ans	141	62	79	7	6	55	73
	70-74 ans	114	63	51	2	4	61	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>584</b>	<b>309</b>	<b>275</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>250</b>	<b>233</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	103	58	45	27	24	31	21
	55-59 ans	97	62	35	7	2	55	33
	60-64 ans	122	61	61	15	6	46	55
	65-69 ans	142	62	80	7	6	55	74
	70-74 ans	113	62	51	2	4	60	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>577</b>	<b>305</b>	<b>272</b>	<b>58</b>	<b>42</b>	<b>247</b>	<b>230</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	107	60	47	28	24	32	23
	55-59 ans	98	62	36	7	2	55	34
	60-64 ans	124	62	62	15	6	47	56
	65-69 ans	143	63	80	7	6	56	74
	70-74 ans	115	64	51	2	4	62	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>587</b>	<b>311</b>	<b>276</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>252</b>	<b>234</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49	24	25	10	12	14	13
	55-59 ans	45	28	17	5	0	23	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	47	15	32	4	3	11	29
	65-69 ans	62	19	43	0	4	19	39
	70-74 ans	35	11	24	0	1	11	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>238</b>	<b>97</b>	<b>141</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>78</b>	<b>121</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	20	14	6	6	2	8	4
	55-59 ans	18	10	8	0	0	10	8
	60-64 ans	30	16	14	3	2	13	12
	65-69 ans	30	14	16	2	0	12	16
	70-74 ans	24	14	10	1	3	13	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>122</b>	<b>68</b>	<b>54</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>56</b>	<b>47</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	16	11	5	6	4	5	1
	55-59 ans	18	10	8	2	2	8	6
	60-64 ans	18	14	4	5	0	9	4
	65-69 ans	28	18	10	4	2	14	8
	70-74 ans	32	23	9	0	0	23	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>76</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>59</b>	<b>28</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	8	6	2	0	0	6	2
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>11</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	36	25	11	12	6	13	5
	55-59 ans	36	20	16	2	2	18	14
	60-64 ans	48	30	18	8	2	22	16
	65-69 ans	58	32	26	6	2	26	24
	70-74 ans	56	37	19	1	3	36	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>234</b>	<b>144</b>	<b>90</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>115</b>	<b>75</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	16	11	5	6	4	5	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	18	10	8	2	2	8	6
	60-64 ans	18	14	4	5	0	9	4
	65-69 ans	28	18	10	4	2	14	8
	70-74 ans	32	23	9	0	0	23	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>76</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>59</b>	<b>28</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	15	10	5	6	4	4	1
	55-59 ans	13	7	6	1	1	6	5
	60-64 ans	14	11	3	4	0	7	3
	65-69 ans	24	16	8	2	2	14	6
	70-74 ans	24	18	6	0	0	18	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>90</b>	<b>62</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>21</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	17	12	5	8	4	4	1
	55-59 ans	17	11	6	2	1	9	5
	60-64 ans	17	14	3	4	0	10	3
	65-69 ans	30	20	10	4	2	16	8
	70-74 ans	30	23	7	0	0	23	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>111</b>	<b>80</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>62</b>	<b>24</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	2	4	1	2	1	2
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	8	6	2	0	0	6	2
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>11</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	8	6	2	0	0	6	2
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>11</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	5	0	0	0	5	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	12	8	4	1	0	7	4
	65-69 ans	19	11	8	4	2	7	6
	70-74 ans	11	6	5	0	1	6	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>17</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,1	4,1	4,1	4,2	4,1	3,9	4,1
	55-59 ans	5	5,3	4,8	8,6	9,2	4,9	4,3
	60-64 ans	4,4	4,5	4,3	8,6	6,6	3,9	4,1
	65-69 ans	4,4	4,1	4,6	4,6	6	4	4,5
	70-74 ans	6	5,5	6,4	7,8	10,7	5,3	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,1	1,2	1,4	1,6	0,8	0,9
	55-59 ans	1,3	1,4	1,1	4,6	4,9	1	0,7
	60-64 ans	0,9	1,1	0,8	4,5	2,1	0,6	0,7
	65-69 ans	0,9	0,8	0,9	1,3	1,7	0,8	0,9
	70-74 ans	1,2	1	1,4	3,9	5	0,9	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71	72,7	69,7	65,7	61,3	80,3	77,5
	55-59 ans	74,8	73	76,3	46,7	46,9	79,5	83,2
	60-64 ans	78,7	76,2	80,8	48,4	68,2	83,6	82,5
	65-69 ans	79,9	80,3	79,6	72,7	71,4	81	80,2
	70-74 ans	79,5	81,1	78,2	50	52,9	83,9	81
	<b>50-74 ans</b>	<b>76,9</b>	<b>76,5</b>	<b>77,1</b>	<b>57,7</b>	<b>59,4</b>	<b>81,8</b>	<b>81,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	2,1	1,3	2	1,4	2,2	1,2
	55-59 ans	1,7	2,4	1,2	2,7	0,9	2,3	1,2
	60-64 ans	1,8	2,1	1,6	4,7	1,8	1,8	1,5
	65-69 ans	2,3	2,4	2,3	4,6	3,5	2,2	2,2
	70-74 ans	2,6	3,2	2,1	1,6	3,3	3,3	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2,4</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,7</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	98,5	100	96,9	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,2	98,6	100	100	100	98,5	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	<b>98,6</b>	<b>100</b>	<b>99,6</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,9	92,3	95,9	90,3	96	94,1	95,8
	55-59 ans	92,5	93,9	90	77,8	66,7	96,5	91,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	91,2	88,6	93,9	93,8	100	87	93,3
	65-69 ans	86,7	82,9	89,9	63,6	75	86,2	91,4
	70-74 ans	91,2	91,3	91,1	100	80	91	92,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,7</b>	<b>89,6</b>	<b>92</b>	<b>85,5</b>	<b>89,4</b>	<b>90,6</b>	<b>92,5</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,3	96,7	95,7	96,4	95,8	96,9	95,7
	55-59 ans	99	98,4	100	100	100	98,2	100
	60-64 ans	99,2	98,4	100	100	100	97,9	100
	65-69 ans	97,2	95,2	98,8	85,7	100	96,4	98,6
	70-74 ans	98,2	96,8	100	100	100	96,7	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>97,1</b>	<b>98,9</b>	<b>96,6</b>	<b>97,6</b>	<b>97,2</b>	<b>99,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	102	96	109	100	87	92	132
	55-59 ans	110	130	76	201	64	121	76
	60-64 ans	91	101	81	67	63	112	82
	65-69 ans	101	101	101	121	85	99	102
	70-74 ans	90	92	87	63	61	93	89
	<b>50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>104</b>	<b>92</b>	<b>105</b>	<b>80</b>	<b>104</b>	<b>94</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76 (50-123)	76,5 (54,5-125,5)	75 (42-123)	81 (52-137)	74 (41,5-114,5)	73,5 (59,5-118)	75 (45-127)
	55-59 ans	78,5 (52-106)	87,5 (52-111)	68 (50,5-100)	109 (46-275)	63,5 (63-64)	86 (52-106)	71,5 (49-101)
	60-64 ans	69 (48-100)	74,5 (54-99)	67 (43-102)	57 (37-88)	63 (37-80)	78 (62-101)	68 (43,5-103,5)
	65-69 ans	78 (48-111)	86 (53-119)	74 (46-107)	119 (41-182)	80 (72-94)	85,5 (57-112)	72,5 (46-109)
	70-74 ans	74,5 (51-97)	75 (47-96)	74 (54-98)	62,5 (31-94)	60,5 (42,5-79,5)	75 (51-96)	75 (56-99)
	<b>50-74 ans</b>	<b>75,5 (49-105)</b>	<b>78 (52-106)</b>	<b>70,5 (46-104)</b>	<b>76 (46-133)</b>	<b>69,5 (42-102)</b>	<b>78 (54-105)</b>	<b>71,5 (47-105)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,2	6,1	4,1	9,4	4	2,9	4,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6,6	6,1	7,5	22,2	33,3	3,5	5,4
	60-64 ans	8,8	11,4	6,1	6,3	0	13	6,7
	65-69 ans	11,5	14,5	9	36,4	25	10,8	7,4
	70-74 ans	8,7	8,6	8,9	0	20	8,8	7,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>9,5</b>	<b>7,3</b>	<b>14,3</b>	<b>10,6</b>	<b>8,3</b>	<b>6,7</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,3	96,7	95,7	96,4	100	96,9	91,3
	55-59 ans	99	100	97,2	100	100	100	97,1
	60-64 ans	98,4	98,4	98,4	100	100	97,9	98,2
	65-69 ans	99,3	98,4	100	100	100	98,2	100
	70-74 ans	99,1	98,4	100	100	100	98,4	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,5</b>	<b>98,4</b>	<b>98,6</b>	<b>98,3</b>	<b>100</b>	<b>98,4</b>	<b>98,3</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,8	40	53,2	35,7	50	43,8	56,5
	55-59 ans	45,9	45,2	47,2	71,4	0	41,8	50
	60-64 ans	37,9	24,2	51,6	26,7	50	23,4	51,8
	65-69 ans	43,4	30,2	53,8	0	66,7	33,9	52,7
	70-74 ans	30,4	17,2	47,1	0	25	17,7	48,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>40,5</b>	<b>31,2</b>	<b>51,1</b>	<b>32,2</b>	<b>47,6</b>	<b>31</b>	<b>51,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,6	6,7	4,3	10,7	8,3	3,1	0
	55-59 ans	5,1	4,8	5,6	0	0	5,5	5,9
	60-64 ans	2,4	4,8	0	13,3	0	2,1	0
	65-69 ans	3,5	4,8	2,5	0	0	5,4	2,7
	70-74 ans	3,5	3,1	3,9	0	0	3,2	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>4,8</b>	<b>2,9</b>	<b>8,5</b>	<b>4,8</b>	<b>4</b>	<b>2,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1,6	0	0	0	1,8	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,9	0	2	0	0	0	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,7	23,3	12,8	21,4	8,3	25	17,4
	55-59 ans	18,4	16,1	22,2	0	0	18,2	23,5
	60-64 ans	24,2	25,8	22,6	20	33,3	27,7	21,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	21	22,2	20	28,6	0	21,4	21,6
	70-74 ans	20,9	21,9	19,6	50	75	21	14,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,8</b>	<b>21,9</b>	<b>19,6</b>	<b>20,3</b>	<b>16,7</b>	<b>22,2</b>	<b>20,1</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15	18,3	10,6	21,4	16,7	15,6	4,3
	55-59 ans	18,4	16,1	22,2	28,6	100	14,5	17,6
	60-64 ans	14,5	22,6	6,5	33,3	0	19,1	7,1
	65-69 ans	19,6	28,6	12,5	57,1	33,3	25	10,8
	70-74 ans	27,8	35,9	17,6	0	0	37,1	19,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,1</b>	<b>24,4</b>	<b>13</b>	<b>28,8</b>	<b>19</b>	<b>23,4</b>	<b>12</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,7	1,7	8,5	3,6	8,3	0	8,7
	55-59 ans	3,1	4,8	0	0	0	5,5	0
	60-64 ans	6,5	9,7	3,2	0	0	12,8	3,6
	65-69 ans	6,3	7,9	5	14,3	0	7,1	5,4
	70-74 ans	7,8	9,4	5,9	50	0	8,1	6,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>6,8</b>	<b>4,7</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>	<b>7,1</b>	<b>4,7</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	1,7	0	0	0	3,1	0
	55-59 ans	2	3,2	0	0	0	3,6	0
	60-64 ans	3,2	3,2	3,2	6,7	0	2,1	3,6
	65-69 ans	4,2	4,8	3,8	0	0	5,4	4,1
	70-74 ans	2,6	4,7	0	0	0	4,8	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,1</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,9	1,6	0	0	0	1,6	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4,7	3,3	6,4	3,6	4,2	3,1	8,7
	55-59 ans	2	1,6	2,8	0	0	1,8	2,9
	60-64 ans	2,4	3,2	1,6	0	0	4,3	1,8
	65-69 ans	0,7	1,6	0	0	0	1,8	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3,5	3,1	3,9	0	0	3,2	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	8	2,9	7,7	3,3	8,4	2,6
	55-59 ans	5,7	7,1	4,6	6	6	7,3	4,5
	60-64 ans	6,4	9,2	4,3	23,3	6,2	7,5	4,1
	65-69 ans	8,2	10	6,7	25,3	8,8	8,7	6,6
	70-74 ans	11,6	16,8	7,3	8,1	19,9	17,3	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,2</b>	<b>9,9</b>	<b>5</b>	<b>11,1</b>	<b>5,3</b>	<b>9,6</b>	<b>5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,1</b>	<b>9,5</b>	<b>4,9</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,5	1,3	3,8	2,2	3,2	0,5
	55-59 ans	2,9	3,6	2,3	6	6	3,2	1,9
	60-64 ans	2,4	4,3	1	14,6	0	3,1	1
	65-69 ans	4	5,6	2,6	16,9	8,8	4,7	2,2
	70-74 ans	6,6	10,4	3,4	0	0	11,1	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>5,2</b>	<b>2</b>	<b>6,5</b>	<b>2,8</b>	<b>4,9</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,4</b>	<b>4,9</b>	<b>2</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,2	1,3	3,8	2,2	2,6	0,5
	55-59 ans	2,1	2,5	1,7	3	3	2,4	1,6
	60-64 ans	1,9	3,4	0,7	11,7	0	2,4	0,8
	65-69 ans	3,4	5	2,1	8,4	8,8	4,7	1,6
	70-74 ans	5	8,2	2,3	0	0	8,6	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>4,2</b>	<b>1,6</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>4,1</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>4</b>	<b>1,6</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,8	1,3	5,1	2,2	2,6	0,5
	55-59 ans	2,7	3,9	1,7	6	3	3,6	1,6
	60-64 ans	2,3	4,3	0,7	11,7	0	3,4	0,8
	65-69 ans	4,2	6,2	2,6	16,9	8,8	5,4	2,2
	70-74 ans	6,2	10,4	2,7	0	0	11,1	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>5,5</b>	<b>1,7</b>	<b>6,9</b>	<b>2,5</b>	<b>5,2</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,4</b>	<b>5,2</b>	<b>1,7</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	0,6	1,1	0,6	1,1	0,6	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,5	1,1	0	0	0	1,2	0
	60-64 ans	1,1	1,8	0,5	0	0	2,1	0,5
	65-69 ans	1,3	1,6	1	4,2	0	1,3	1,1
	70-74 ans	1,9	2,7	1,1	8,1	0	2,4	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	100	50	100	0	0	50
	55-59 ans	100	100	0	0	0	100	0
	60-64 ans	62,5	66,7	50	0	0	66,7	50
	65-69 ans	66,7	60	75	100	0	50	75
	70-74 ans	66,7	50	100	0	0	60	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>67,7</b>	<b>65</b>	<b>72,7</b>	<b>66,7</b>	<b>0</b>	<b>64,7</b>	<b>72,7</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)