

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17 556	8 462	9 094	6 000	6 366	2 462	2 728
	55-59 ans	13 887	6 196	7 691	1 878	2 341	4 318	5 350
	60-64 ans	14 715	6 190	8 525	1 687	2 307	4 503	6 218
	65-69 ans	14 114	6 022	8 092	1 488	1 896	4 534	6 196
	70-74 ans	10 468	4 492	5 976	968	1 275	3 524	4 701
	<b>50-74 ans</b>	<b>70 740</b>	<b>31 362</b>	<b>39 378</b>	<b>12 021</b>	<b>14 185</b>	<b>19 341</b>	<b>25 193</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 472	705	767	528	565	177	202
	55-59 ans	1 270	560	710	235	267	325	443
	60-64 ans	1 273	540	733	194	261	346	472
	65-69 ans	1 162	479	683	160	210	319	473
	70-74 ans	901	411	490	131	150	280	340
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 078</b>	<b>2 695</b>	<b>3 383</b>	<b>1 248</b>	<b>1 453</b>	<b>1 447</b>	<b>1 930</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	839	393	446	277	303	116	143
	55-59 ans	785	354	431	134	146	220	285
	60-64 ans	816	348	468	100	140	248	328
	65-69 ans	778	320	458	89	112	231	346
	70-74 ans	597	271	326	67	79	204	247
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 815</b>	<b>1 686</b>	<b>2 129</b>	<b>667</b>	<b>780</b>	<b>1 019</b>	<b>1 349</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	633	312	321	251	262	61	59
	55-59 ans	485	206	279	101	121	105	158
	60-64 ans	457	192	265	94	121	98	144
	65-69 ans	384	159	225	71	98	88	127
	70-74 ans	304	140	164	64	71	76	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 263</b>	<b>1 009</b>	<b>1 254</b>	<b>581</b>	<b>673</b>	<b>428</b>	<b>581</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16 923	8 150	8 773	5 749	6 104	2 401	2 669
	55-59 ans	13 402	5 990	7 412	1 777	2 220	4 213	5 192
	60-64 ans	14 258	5 998	8 260	1 593	2 186	4 405	6 074
	65-69 ans	13 730	5 863	7 867	1 417	1 798	4 446	6 069
	70-74 ans	10 164	4 352	5 812	904	1 204	3 448	4 608
	<b>50-74 ans</b>	<b>68 477</b>	<b>30 353</b>	<b>38 124</b>	<b>11 440</b>	<b>13 512</b>	<b>18 913</b>	<b>24 612</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	213	107	106	76	76	31	30
	55-59 ans	167	94	73	28	26	66	47
	60-64 ans	204	102	102	28	29	74	73
	65-69 ans	186	90	96	28	29	62	67
	70-74 ans	165	68	97	19	30	49	67

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>935</b>	<b>461</b>	<b>474</b>	<b>179</b>	<b>190</b>	<b>282</b>	<b>284</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	209	104	105	73	75	31	30
	55-59 ans	165	92	73	26	26	66	47
	60-64 ans	202	101	101	28	28	73	73
	65-69 ans	184	88	96	28	29	60	67
	70-74 ans	165	68	97	19	30	49	67
	<b>50-74 ans</b>	<b>925</b>	<b>453</b>	<b>472</b>	<b>174</b>	<b>188</b>	<b>279</b>	<b>284</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	151	73	78	47	55	26	23
	55-59 ans	120	63	57	14	22	49	35
	60-64 ans	156	73	83	13	23	60	60
	65-69 ans	140	59	81	17	20	42	61
	70-74 ans	125	51	74	12	22	39	52
	<b>50-74 ans</b>	<b>692</b>	<b>319</b>	<b>373</b>	<b>103</b>	<b>142</b>	<b>216</b>	<b>231</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	132	66	66	41	46	25	20
	55-59 ans	103	56	47	13	18	43	29
	60-64 ans	136	64	72	11	20	53	52
	65-69 ans	117	50	67	15	18	35	49
	70-74 ans	96	38	58	9	16	29	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>584</b>	<b>274</b>	<b>310</b>	<b>89</b>	<b>118</b>	<b>185</b>	<b>192</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	149	72	77	46	54	26	23
	55-59 ans	119	62	57	14	22	48	35

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	156	73	83	13	23	60	60
	65-69 ans	133	58	75	16	20	42	55
	70-74 ans	124	50	74	12	22	38	52
	<b>50-74 ans</b>	<b>681</b>	<b>315</b>	<b>366</b>	<b>101</b>	<b>141</b>	<b>214</b>	<b>225</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	7	1	6	1	0	0	6
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	151	73	78	47	55	26	23
	55-59 ans	117	61	56	13	21	48	35
	60-64 ans	156	73	83	13	23	60	60
	65-69 ans	137	59	78	17	19	42	59
	70-74 ans	125	51	74	12	22	39	52
	<b>50-74 ans</b>	<b>686</b>	<b>317</b>	<b>369</b>	<b>102</b>	<b>140</b>	<b>215</b>	<b>229</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	152	74	78	48	55	26	23
	55-59 ans	120	63	57	14	22	49	35
	60-64 ans	156	73	83	13	23	60	60
	65-69 ans	140	59	81	17	20	42	61
	70-74 ans	125	51	74	12	22	39	52
	<b>50-74 ans</b>	<b>693</b>	<b>320</b>	<b>373</b>	<b>104</b>	<b>142</b>	<b>216</b>	<b>231</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	82	34	48	25	36	9	12
	55-59 ans	51	19	32	2	10	17	22
	60-64 ans	82	31	51	10	15	21	36
	65-69 ans	60	16	44	3	11	13	33
	70-74 ans	57	16	41	4	13	12	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>332</b>	<b>116</b>	<b>216</b>	<b>44</b>	<b>85</b>	<b>72</b>	<b>131</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	4	2	3	0	1	2
	55-59 ans	6	3	3	1	1	2	2
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	5	2	3	1	2	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17	8	9	5	5	3	4
	55-59 ans	19	13	6	1	2	12	4
	60-64 ans	26	13	13	0	2	13	11
	65-69 ans	23	15	8	5	1	10	7
	70-74 ans	18	8	10	2	1	6	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>103</b>	<b>57</b>	<b>46</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>44</b>	<b>35</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25	17	8	9	6	8	2
	55-59 ans	26	19	7	6	2	13	5
	60-64 ans	26	18	8	2	4	16	4
	65-69 ans	22	11	11	3	3	8	8
	70-74 ans	21	11	10	1	3	10	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>120</b>	<b>76</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>55</b>	<b>26</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	2	4	1	3	1	1
	55-59 ans	6	2	4	0	4	2	0
	60-64 ans	8	5	3	0	2	5	1
	65-69 ans	14	8	6	3	0	5	6
	70-74 ans	13	9	4	1	2	8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>10</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	10	8	2	5	2	3	0
	55-59 ans	7	4	3	2	2	2	1
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	11	5	6	2	1	3	5
	70-74 ans	10	5	5	4	2	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	42	25	17	14	11	11	6
	55-59 ans	45	32	13	7	4	25	9
	60-64 ans	52	31	21	2	6	29	15
	65-69 ans	45	26	19	8	4	18	15
	70-74 ans	39	19	20	3	4	16	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>223</b>	<b>133</b>	<b>90</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>99</b>	<b>61</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	25	17	8	9	6	8	2
	55-59 ans	26	19	7	6	2	13	5
	60-64 ans	26	18	8	2	4	16	4
	65-69 ans	22	11	11	3	3	8	8
	70-74 ans	21	11	10	1	3	10	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>120</b>	<b>76</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>55</b>	<b>26</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	19	13	6	8	4	5	2
	55-59 ans	20	15	5	6	1	9	4
	60-64 ans	21	14	7	2	3	12	4
	65-69 ans	18	9	9	2	3	7	6
	70-74 ans	18	9	9	0	3	9	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>96</b>	<b>60</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>22</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	23	15	8	10	6	5	2
	55-59 ans	21	15	6	6	1	9	5
	60-64 ans	27	19	8	2	4	17	4
	65-69 ans	22	12	10	3	3	9	7
	70-74 ans	21	10	11	0	3	10	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>114</b>	<b>71</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>26</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	2	4	1	3	1	1
	55-59 ans	6	2	4	0	4	2	0
	60-64 ans	8	5	3	0	2	5	1
	65-69 ans	14	8	6	3	0	5	6
	70-74 ans	13	9	4	1	2	8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>10</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	2	4	1	3	1	1
	55-59 ans	6	2	4	0	4	2	0
	60-64 ans	8	5	3	0	2	5	1
	65-69 ans	14	8	6	3	0	5	6
	70-74 ans	13	9	4	1	2	8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>10</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	2	4	1	3	1	1
	55-59 ans	6	2	4	0	4	2	0
	60-64 ans	7	4	3	0	2	4	1
	65-69 ans	9	6	3	3	0	3	3
	70-74 ans	13	9	4	1	2	8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>7</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	30	15	15	13	11	2	4
	55-59 ans	26	16	10	8	2	8	8
	60-64 ans	33	20	13	12	3	8	10
	65-69 ans	29	20	9	8	6	12	3
	70-74 ans	26	11	15	3	7	8	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>144</b>	<b>82</b>	<b>62</b>	<b>44</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>33</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,4	8,3	8,4	8,8	8,9	7,2	7,4
	55-59 ans	9,1	9	9,2	12,5	11,4	7,5	8,3
	60-64 ans	8,7	8,7	8,6	11,5	11,3	7,7	7,6
	65-69 ans	8,2	8	8,4	10,8	11,1	7	7,6
	70-74 ans	8,6	9,1	8,2	13,5	11,8	7,9	7,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>10,4</b>	<b>10,2</b>	<b>7,5</b>	<b>7,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,6	3,7	3,5	4,2	4,1	2,5	2,2
	55-59 ans	3,5	3,3	3,6	5,4	5,2	2,4	3
	60-64 ans	3,1	3,1	3,1	5,6	5,2	2,2	2,3
	65-69 ans	2,7	2,6	2,8	4,8	5,2	1,9	2
	70-74 ans	2,9	3,1	2,7	6,6	5,6	2,2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	57	55,7	58,1	52,5	53,6	65,5	70,8
	55-59 ans	61,8	63,2	60,7	57	54,7	67,7	64,3
	60-64 ans	64,1	64,4	63,8	51,5	53,6	71,7	69,5
	65-69 ans	67	66,8	67,1	55,6	53,3	72,4	73,2
	70-74 ans	66,3	65,9	66,5	51,1	52,7	72,9	72,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>62,8</b>	<b>62,6</b>	<b>62,9</b>	<b>53,4</b>	<b>53,7</b>	<b>70,4</b>	<b>69,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,2	1,3	1,2	1,3	1,1
	55-59 ans	1,2	1,6	1	1,6	1,2	1,6	0,9
	60-64 ans	1,4	1,7	1,2	1,8	1,3	1,7	1,2
	65-69 ans	1,4	1,5	1,2	2	1,6	1,4	1,1
	70-74 ans	1,6	1,6	1,7	2,1	2,5	1,4	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,1	97,2	99,1	96,1	98,7	100	100
	55-59 ans	98,8	97,9	100	92,9	100	100	100
	60-64 ans	99	99	99	100	96,6	98,6	100
	65-69 ans	98,9	97,8	100	100	100	96,8	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>98,3</b>	<b>99,6</b>	<b>97,2</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	72,2	70,2	74,3	64,4	73,3	83,9	76,7
	55-59 ans	72,7	68,5	78,1	53,8	84,6	74,2	74,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	77,2	72,3	82,2	46,4	82,1	82,2	82,2
	65-69 ans	76,1	67	84,4	60,7	69	70	91
	70-74 ans	75,8	75	76,3	63,2	73,3	79,6	77,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>74,8</b>	<b>70,4</b>	<b>79</b>	<b>59,2</b>	<b>75,5</b>	<b>77,4</b>	<b>81,3</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	87,4	90,4	84,6	87,2	83,6	96,2	87
	55-59 ans	85,8	88,9	82,5	92,9	81,8	87,8	82,9
	60-64 ans	87,2	87,7	86,7	84,6	87	88,3	86,7
	65-69 ans	83,6	84,7	82,7	88,2	90	83,3	80,3
	70-74 ans	76,8	74,5	78,4	75	72,7	74,4	80,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>84,4</b>	<b>85,9</b>	<b>83,1</b>	<b>86,4</b>	<b>83,1</b>	<b>85,6</b>	<b>83,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	6	6	5	5
	60-64 ans	6	5	6	6	6	5	6
	65-69 ans	6	6	5	6	6	6	5
	70-74 ans	6	6	5	6	6	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)
	55-59 ans	4 (2-7)	4 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)
	60-64 ans	5 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-7)	4 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-7)
	65-69 ans	5 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-7)	5 (3-7)	5 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-7)
	70-74 ans	5 (2-7)	5 (2-7)	4 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-7)	4 (2-7)
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 (2-7)</b>	<b>5 (2-7)</b>	<b>5 (2-7)</b>	<b>5 (2-7)</b>	<b>5 (2-7)</b>	<b>4 (2-7)</b>	<b>5 (2-7)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74	71	76	73	87	69	53
	55-59 ans	61	62	61	47	54	66	66
	60-64 ans	63	60	66	48	59	63	69
	65-69 ans	63	62	64	48	63	68	64
	70-74 ans	72	74	71	104	95	65	61
	<b>50-74 ans</b>	<b>67</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>66</b>	<b>75</b>	<b>65</b>	<b>64</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57,5 (36-98)	57 (36,5-92)	59,5 (35-103)	53,5 (36-97)	68 (37-113)	58,5 (40-81)	49 (34-72)
	55-59 ans	50 (32,5-76)	51 (32-79)	50 (33-74)	45,5 (32-56)	43 (34-50)	56 (32-88)	65 (29-77)
	60-64 ans	51 (35-74)	48,5 (35-71)	52 (35-78)	43 (27-55)	50 (35-83)	50 (35-75)	52,5 (35-77,5)
	65-69 ans	47 (35-77)	49 (33-77)	46 (35-78)	43 (26-64)	48 (38-85)	51,5 (35-77)	46 (35-76)
	70-74 ans	54 (32-84)	50 (34-76)	54,5 (32-85,5)	52 (43,5-87,5)	68 (35-91)	50 (29-76)	50 (32-77)
	<b>50-74 ans</b>	<b>51 (35-79)</b>	<b>51 (35-77)</b>	<b>51 (35-81)</b>	<b>48,5 (36-77)</b>	<b>57 (35-93)</b>	<b>53 (34-78)</b>	<b>50 (34-76)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	14,1	14	14,2	17,1	14,5	6,5	13,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	15,6	17	13,7	28,6	7,7	12,1	17
	60-64 ans	16,2	19,6	12,7	42,9	10,3	10,8	13,7
	65-69 ans	15,6	22,2	9,4	28,6	20,7	19,4	4,5
	70-74 ans	15,8	16,2	15,5	15,8	23,3	16,3	11,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,4</b>	<b>17,8</b>	<b>13,1</b>	<b>24,6</b>	<b>15,3</b>	<b>13,5</b>	<b>11,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	97,5	96,8	98,2	92,9	95,5	98	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	97,9	100	96,3	100	95	100	96,7
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>99,4</b>	<b>98,9</b>	<b>99</b>	<b>98,6</b>	<b>99,5</b>	<b>99,1</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,9	45,9	61,5	52,1	65,5	34,6	52,2
	55-59 ans	42,5	30,2	56,1	14,3	45,5	34,7	62,9
	60-64 ans	52,6	42,5	61,4	76,9	65,2	35	60
	65-69 ans	42,9	27,1	54,3	17,6	55	31	54,1
	70-74 ans	45,6	31,4	55,4	33,3	59,1	30,8	53,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>47,9</b>	<b>36,3</b>	<b>57,9</b>	<b>42,3</b>	<b>59,9</b>	<b>33,3</b>	<b>56,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,9	5,4	2,6	6,3	0	3,8	8,7
	55-59 ans	5	4,8	5,3	7,1	4,5	4,1	5,7
	60-64 ans	3,8	4,1	3,6	0	0	5	5
	65-69 ans	3,6	3,4	3,7	5,9	10	2,4	1,6
	70-74 ans	2,4	3,9	1,4	0	0	5,1	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>4,4</b>	<b>3,2</b>	<b>4,8</b>	<b>2,1</b>	<b>4,2</b>	<b>3,9</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	0	1,2	0	5	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,2	10,8	11,5	10,4	9,1	11,5	17,4
	55-59 ans	15,8	20,6	10,5	7,1	9,1	24,5	11,4
	60-64 ans	16,7	17,8	15,7	0	8,7	21,7	18,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	16,4	25,4	9,9	29,4	5	23,8	11,5
	70-74 ans	14,4	15,7	13,5	16,7	4,5	15,4	17,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,9</b>	<b>17,8</b>	<b>12,3</b>	<b>12,5</b>	<b>7,7</b>	<b>20,4</b>	<b>15,2</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,4	23	10,3	18,8	10,9	30,8	8,7
	55-59 ans	21,7	30,2	12,3	42,9	9,1	26,5	14,3
	60-64 ans	16,7	24,7	9,6	15,4	17,4	26,7	6,7
	65-69 ans	15,7	18,6	13,6	17,6	15	19	13,1
	70-74 ans	16,8	21,6	13,5	8,3	13,6	25,6	13,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,3</b>	<b>23,8</b>	<b>11,8</b>	<b>20,2</b>	<b>12,7</b>	<b>25,5</b>	<b>11,3</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	2,7	5,1	2,1	5,5	3,8	4,3
	55-59 ans	5	3,2	7	0	18,2	4,1	0
	60-64 ans	5,1	6,8	3,6	0	8,7	8,3	1,7
	65-69 ans	10	13,6	7,4	17,6	0	11,9	9,8
	70-74 ans	10,4	17,6	5,4	8,3	9,1	20,5	3,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>8,1</b>	<b>5,6</b>	<b>4,8</b>	<b>7,7</b>	<b>9,7</b>	<b>4,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,6	10,8	2,6	10,4	3,6	11,5	0
	55-59 ans	5,8	6,3	5,3	14,3	9,1	4,1	2,9
	60-64 ans	2,6	2,7	2,4	7,7	0	1,7	3,3
	65-69 ans	7,9	8,5	7,4	11,8	5	7,1	8,2
	70-74 ans	8	9,8	6,8	33,3	9,1	2,6	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>7,5</b>	<b>4,8</b>	<b>13,5</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,7	1,6	1,8	7,1	4,5	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	0	1,2	0	5	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,1	1,9	2,4	1,8	4,6	2,2
	55-59 ans	3,4	5,3	1,8	3,9	1,8	5,9	1,7
	60-64 ans	3,6	5,2	2,5	1,3	2,7	6,6	2,5
	65-69 ans	3,3	4,4	2,4	5,6	2,2	4	2,5
	70-74 ans	3,8	4,4	3,4	3,3	3,3	4,6	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>4,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3</b>	<b>2,1</b>	<b>5,2</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2,3</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,1	0,9	1,6	1	3,3	0,7
	55-59 ans	1,9	3,2	0,9	3,4	0,9	3,1	1
	60-64 ans	1,8	3	1	1,3	1,8	3,6	0,7
	65-69 ans	1,6	1,9	1,4	2,1	1,7	1,8	1,3
	70-74 ans	2,1	2,5	1,7	1,1	2,5	2,9	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,8</b>	<b>2,6</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,6	0,7	1,4	0,7	2,1	0,7
	55-59 ans	1,5	2,5	0,7	3,4	0,5	2,1	0,8
	60-64 ans	1,5	2,3	0,8	1,3	1,4	2,7	0,7
	65-69 ans	1,3	1,5	1,1	1,4	1,7	1,6	1
	70-74 ans	1,8	2,1	1,5	0	2,5	2,6	1,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,6</b>	<b>1</b>	<b>2,2</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>0,9</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,8	0,9	1,7	1	2,1	0,7
	55-59 ans	1,6	2,5	0,8	3,4	0,5	2,1	1
	60-64 ans	1,9	3,2	1	1,3	1,8	3,9	0,7
	65-69 ans	1,6	2	1,3	2,1	1,7	2	1,2
	70-74 ans	2,1	2,3	1,9	0	2,5	2,9	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>2,6</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,7</b>	<b>2,4</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,2	0,5	0,2	0,5	0,4	0,4

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,4	0,3	0,5	0	1,8	0,5	0
	60-64 ans	0,6	0,8	0,4	0	0,9	1,1	0,2
	65-69 ans	1	1,4	0,8	2,1	0	1,1	1
	70-74 ans	1,3	2,1	0,7	1,1	1,7	2,3	0,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	0	100	100	0
	60-64 ans	87,5	80	100	0	100	80	100
	65-69 ans	64,3	75	50	100	0	60	50
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>87,2</b>	<b>88,5</b>	<b>85,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>85,7</b>	<b>70</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)