

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région : 53 - Région: BRETAGNE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	35	26	9	17	7	9	2
	55-59 ans	57	41	16	17	3	24	13
	60-64 ans	80	49	31	12	8	37	23
	65-69 ans	100	58	42	17	3	41	39
	70-74 ans	84	50	34	8	6	42	28
	50-74 ans	356	224	132	71	27	153	105
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	15	10	5	5	1	5	4
	60-64 ans	16	11	5	2	1	9	4
	65-69 ans	23	16	7	6	0	10	7
	70-74 ans	26	14	12	0	2	14	10
	50-74 ans	85	55	30	16	5	39	25
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	30	22	8	14	6	8	2
	55-59 ans	42	31	11	12	2	19	9
	60-64 ans	64	38	26	10	7	28	19
	65-69 ans	77	42	35	11	3	31	32
	70-74 ans	58	36	22	8	4	28	18
	50-74 ans	271	169	102	55	22	114	80
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	17	13	4	9	3	4	1
	55-59 ans	28	21	7	7	2	14	5
	60-64 ans	44	30	14	9	7	21	7
	65-69 ans	53	28	25	8	3	20	22
	70-74 ans	47	29	18	7	4	22	14
	50-74 ans	189	121	68	40	19	81	49
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	13	9	4	5	3	4	1
	55-59 ans	14	10	4	5	0	5	4
	60-64 ans	20	8	12	1	0	7	12
	65-69 ans	24	14	10	3	0	11	10
	70-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
	50-74 ans	82	48	34	15	3	33	31
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	10	8	2	6	1	2	1
	55-59 ans	11	8	3	4	0	4	3
	60-64 ans	24	17	7	5	4	12	3

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	21	13	8	6	1	7	7
	70-74 ans	14	10	4	1	1	9	3
	50-74 ans	80	56	24	22	7	34	17
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	8	6	2	1	1	5	1
	60-64 ans	8	5	3	0	1	5	2
	65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4
	70-74 ans	11	7	4	1	1	6	3
	50-74 ans	38	24	14	3	4	21	10
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	12	4	8	0	0	4	8
	70-74 ans	13	6	7	2	0	4	7
	50-74 ans	39	19	20	7	4	12	16
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	8	5	3	2	1	3	2
	65-69 ans	9	5	4	1	1	4	3
	70-74 ans	9	6	3	3	2	3	1
	50-74 ans	32	22	10	8	4	14	6

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	14,3	15,4	11,1	17,6	14,3	11,1	0
	55-59 ans	26,3	24,4	31,3	29,4	33,3	20,8	30,8
	60-64 ans	20	22,4	16,1	16,7	12,5	24,3	17,4
	65-69 ans	23	27,6	16,7	35,3	0	24,4	17,9
	70-74 ans	31	28	35,3	0	33,3	33,3	35,7
	50-74 ans	23,9	24,6	22,7	22,5	18,5	25,5	23,8
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	43,3	40,9	50	35,7	50	50	50
	55-59 ans	33,3	32,3	36,4	41,7	0	26,3	44,4
	60-64 ans	31,3	21,1	46,2	10	0	25	63,2
	65-69 ans	31,2	33,3	28,6	27,3	0	35,5	31,3
	70-74 ans	19	19,4	18,2	12,5	0	21,4	22,2
	50-74 ans	30,3	28,4	33,3	27,3	13,6	28,9	38,8
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	56,7	59,1	50	64,3	50	50	50
	55-59 ans	66,7	67,7	63,6	58,3	100	73,7	55,6
	60-64 ans	68,8	78,9	53,8	90	100	75	36,8
	65-69 ans	68,8	66,7	71,4	72,7	100	64,5	68,8
	70-74 ans	81	80,6	81,8	87,5	100	78,6	77,8
	50-74 ans	69,7	71,6	66,7	72,7	86,4	71,1	61,3
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	58,8	61,5	50	66,7	33,3	50	100
	55-59 ans	39,3	38,1	42,9	57,1	0	28,6	60
	60-64 ans	54,5	56,7	50	55,6	57,1	57,1	42,9
	65-69 ans	39,6	46,4	32	75	33,3	35	31,8
	70-74 ans	29,8	34,5	22,2	14,3	25	40,9	21,4
	50-74 ans	42,3	46,3	35,3	55	36,8	42	34,7
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	28,6	28,6	28,6	14,3	50	35,7	20
	60-64 ans	18,2	16,7	21,4	0	14,3	23,8	28,6

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	20,8	21,4	20	12,5	33,3	25	18,2
	70-74 ans	23,4	24,1	22,2	14,3	25	27,3	21,4
	50-74 ans	20,1	19,8	20,6	7,5	21,1	25,9	20,4
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	29,4	23,1	50	22,2	66,7	25	0
	55-59 ans	17,9	14,3	28,6	14,3	50	14,3	20
	60-64 ans	9,1	10	7,1	22,2	14,3	4,8	0
	65-69 ans	22,6	14,3	32	0	0	20	36,4
	70-74 ans	27,7	20,7	38,9	28,6	0	18,2	50
	50-74 ans	20,6	15,7	29,4	17,5	21,1	14,8	32,7
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	11,8	15,4	0	11,1	0	25	0
	55-59 ans	14,3	19	0	14,3	0	21,4	0
	60-64 ans	18,2	16,7	21,4	22,2	14,3	14,3	28,6
	65-69 ans	17	17,9	16	12,5	33,3	20	13,6
	70-74 ans	19,1	20,7	16,7	42,9	50	13,6	7,1
	50-74 ans	16,9	18,2	14,7	20	21,1	17,3	12,2

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire