

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 2691 | 1201 | 1490 | 815 | 952 | 386 | 538 |
| | 55-59 ans | 2251 | 1035 | 1216 | 394 | 409 | 641 | 807 |
| | 60-64 ans | 2918 | 1289 | 1629 | 380 | 400 | 909 | 1229 |
| | 65-69 ans | 2773 | 1220 | 1553 | 248 | 266 | 972 | 1287 |
| | 70-74 ans | 2230 | 1069 | 1161 | 150 | 234 | 919 | 927 |
| | 50-74 ans | 12863 | 5814 | 7049 | 1987 | 2261 | 3827 | 4788 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 97 | 36 | 61 | 28 | 36 | 8 | 25 |
| | 55-59 ans | 131 | 64 | 67 | 32 | 26 | 32 | 41 |
| | 60-64 ans | 124 | 54 | 70 | 22 | 23 | 32 | 47 |
| | 65-69 ans | 113 | 42 | 71 | 11 | 21 | 31 | 50 |
| | 70-74 ans | 126 | 57 | 69 | 11 | 18 | 46 | 51 |
| | 50-74 ans | 591 | 253 | 338 | 104 | 124 | 149 | 214 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 60 | 21 | 39 | 15 | 19 | 6 | 20 |
| | 55-59 ans | 78 | 40 | 38 | 17 | 10 | 23 | 28 |
| | 60-64 ans | 85 | 39 | 46 | 14 | 10 | 25 | 36 |
| | 65-69 ans | 73 | 30 | 43 | 7 | 10 | 23 | 33 |
| | 70-74 ans | 89 | 38 | 51 | 4 | 10 | 34 | 41 |
| | 50-74 ans | 385 | 168 | 217 | 57 | 59 | 111 | 158 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 37 | 15 | 22 | 13 | 17 | 2 | 5 |
| | 55-59 ans | 53 | 24 | 29 | 15 | 16 | 9 | 13 |
| | 60-64 ans | 39 | 15 | 24 | 8 | 13 | 7 | 11 |
| | 65-69 ans | 40 | 12 | 28 | 4 | 11 | 8 | 17 |
| | 70-74 ans | 37 | 19 | 18 | 7 | 8 | 12 | 10 |
| | 50-74 ans | 206 | 85 | 121 | 47 | 65 | 38 | 56 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 2654 | 1186 | 1468 | 802 | 935 | 384 | 533 |
| | 55-59 ans | 2198 | 1011 | 1187 | 379 | 393 | 632 | 794 |
| | 60-64 ans | 2879 | 1274 | 1605 | 372 | 387 | 902 | 1218 |
| | 65-69 ans | 2733 | 1208 | 1525 | 244 | 255 | 964 | 1270 |
| | 70-74 ans | 2193 | 1050 | 1143 | 143 | 226 | 907 | 917 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| | 50-74 ans | 12657 | 5729 | 6928 | 1940 | 2196 | 3789 | 4732 |
|--|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 25 | 14 | 11 | 11 | 7 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 51 | 27 | 24 | 9 | 5 | 18 | 19 |
| | 60-64 ans | 54 | 23 | 31 | 7 | 9 | 16 | 22 |
| | 65-69 ans | 53 | 25 | 28 | 6 | 10 | 19 | 18 |
| | 70-74 ans | 61 | 39 | 22 | 6 | 3 | 33 | 19 |
| | 50-74 ans | 244 | 128 | 116 | 39 | 34 | 89 | 82 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 25 | 14 | 11 | 11 | 7 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 49 | 27 | 22 | 9 | 4 | 18 | 18 |
| | 60-64 ans | 53 | 23 | 30 | 7 | 9 | 16 | 21 |
| | 65-69 ans | 53 | 25 | 28 | 6 | 10 | 19 | 18 |
| | 70-74 ans | 59 | 37 | 22 | 6 | 3 | 31 | 19 |
| | 50-74 ans | 239 | 126 | 113 | 39 | 33 | 87 | 80 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 23 | 13 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 44 | 26 | 18 | 8 | 4 | 18 | 14 |
| | 60-64 ans | 51 | 21 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 |
| | 65-69 ans | 50 | 25 | 25 | 6 | 9 | 19 | 16 |
| | 70-74 ans | 51 | 30 | 21 | 4 | 2 | 26 | 19 |
| | 50-74 ans | 219 | 115 | 104 | 33 | 30 | 82 | 74 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 22 | 12 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 37 | 22 | 15 | 7 | 4 | 15 | 11 |
| | 60-64 ans | 43 | 20 | 23 | 4 | 8 | 16 | 15 |
| | 65-69 ans | 43 | 21 | 22 | 4 | 9 | 17 | 13 |
| | 70-74 ans | 47 | 28 | 19 | 3 | 2 | 25 | 17 |
| | 50-74 ans | 192 | 103 | 89 | 27 | 29 | 76 | 60 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 23 | 13 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 44 | 26 | 18 | 8 | 4 | 18 | 14 |
| | 60-64 ans | 50 | 21 | 29 | 5 | 9 | 16 | 20 |
| | 65-69 ans | 50 | 25 | 25 | 6 | 9 | 19 | 16 |
| | 70-74 ans | 49 | 29 | 20 | 4 | 2 | 25 | 18 |
| | 50-74 ans | 216 | 114 | 102 | 33 | 30 | 81 | 72 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 23 | 13 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 44 | 26 | 18 | 8 | 4 | 18 | 14 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 60-64 ans | 50 | 21 | 29 | 5 | 9 | 16 | 20 |
| | 65-69 ans | 50 | 25 | 25 | 6 | 9 | 19 | 16 |
| | 70-74 ans | 50 | 30 | 20 | 4 | 2 | 26 | 18 |
| | 50-74 ans | 217 | 115 | 102 | 33 | 30 | 82 | 72 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 23 | 13 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 45 | 26 | 19 | 8 | 5 | 18 | 14 |
| | 60-64 ans | 51 | 21 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 |
| | 65-69 ans | 50 | 25 | 25 | 6 | 9 | 19 | 16 |
| | 70-74 ans | 53 | 32 | 21 | 5 | 2 | 27 | 19 |
| | 50-74 ans | 222 | 117 | 105 | 34 | 31 | 83 | 74 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 14 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 24 | 12 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 |
| | 60-64 ans | 31 | 14 | 17 | 3 | 5 | 11 | 12 |
| | 65-69 ans | 25 | 10 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 |
| | 70-74 ans | 26 | 16 | 10 | 2 | 1 | 14 | 9 |
| | 50-74 ans | 120 | 59 | 61 | 12 | 19 | 47 | 42 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| | 70-74 ans | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| | 50-74 ans | 25 | 16 | 9 | 11 | 3 | 5 | 6 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| | 70-74 ans | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| | 50-74 ans | 27 | 19 | 8 | 6 | 2 | 13 | 6 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 65-69 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | 50-74 ans | 24 | 12 | 12 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| | 70-74 ans | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| | 50-74 ans | 52 | 35 | 17 | 17 | 5 | 18 | 12 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| | 70-74 ans | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| | 50-74 ans | 27 | 19 | 8 | 6 | 2 | 13 | 6 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| | 50-74 ans | 20 | 14 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| | 50-74 ans | 22 | 15 | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 65-69 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | 50-74 ans | 24 | 12 | 12 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 65-69 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | 50-74 ans | 23 | 11 | 12 | 2 | 5 | 9 | 7 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | 65-69 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | 50-74 ans | 21 | 9 | 12 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 65-69 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | 50-74 ans | 17 | 7 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 65-69 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | 50-74 ans | 21 | 9 | 12 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 3,6 | 3 | 4,1 | 3,4 | 3,8 | 2,1 | 4,6 |
| | 55-59 ans | 5,8 | 6,2 | 5,5 | 8,1 | 6,4 | 5 | 5,1 |
| | 60-64 ans | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 5,8 | 5,8 | 3,5 | 3,8 |
| | 65-69 ans | 4,1 | 3,4 | 4,6 | 4,4 | 7,9 | 3,2 | 3,9 |
| | 70-74 ans | 5,7 | 5,3 | 5,9 | 7,3 | 7,7 | 5 | 5,5 |
| | 50-74 ans | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 3,9 | 4,5 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 0,5 | 0,9 |
| | 55-59 ans | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 3,8 | 3,9 | 1,4 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 3,3 | 0,8 | 0,9 |
| | 65-69 ans | 1,4 | 1 | 1,8 | 1,6 | 4,1 | 0,8 | 1,3 |
| | 70-74 ans | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 4,7 | 3,4 | 1,3 | 1,1 |
| | 50-74 ans | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 1 | 1,2 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 61,9 | 58,3 | 63,9 | 53,6 | 52,8 | 75 | 80 |
| | 55-59 ans | 59,5 | 62,5 | 56,7 | 53,1 | 38,5 | 71,9 | 68,3 |
| | 60-64 ans | 68,5 | 72,2 | 65,7 | 63,6 | 43,5 | 78,1 | 76,6 |
| | 65-69 ans | 64,6 | 71,4 | 60,6 | 63,6 | 47,6 | 74,2 | 66 |
| | 70-74 ans | 70,6 | 66,7 | 73,9 | 36,4 | 55,6 | 73,9 | 80,4 |
| | 50-74 ans | 65,1 | 66,4 | 64,2 | 54,8 | 47,6 | 74,5 | 73,8 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| | 55-59 ans | 2,3 | 2,7 | 2 | 2,4 | 1,3 | 2,8 | 2,4 |
| | 60-64 ans | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 1,8 |
| | 65-69 ans | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 2 | 1,4 |
| | 70-74 ans | 2,8 | 3,7 | 1,9 | 4,2 | 1,3 | 3,6 | 2,1 |
| | 50-74 ans | 1,9 | 2,2 | 1,7 | 2 | 1,5 | 2,3 | 1,7 |
| 50-74 ans** | 1,9 | 2,2 | 1,6 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 96,1 | 100 | 91,7 | 100 | 80 | 100 | 94,7 |
| | 60-64 ans | 98,1 | 100 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 95,5 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 96,7 | 94,9 | 100 | 100 | 100 | 93,9 | 100 |
| | 50-74 ans | 98 | 98,4 | 97,4 | 100 | 97,1 | 97,8 | 97,6 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 92 | 92,9 | 90,9 | 90,9 | 85,7 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 89,8 | 96,3 | 81,8 | 88,9 | 100 | 100 | 77,8 |
| | 60-64 ans | 96,2 | 91,3 | 100 | 71,4 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 94,3 | 100 | 89,3 | 100 | 90 | 100 | 88,9 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 86,4 | 81,1 | 95,5 | 66,7 | 66,7 | 83,9 | 100 |
| | 50-74 ans | 91,6 | 91,3 | 92 | 84,6 | 90,9 | 94,3 | 92,5 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 95,7 | 92,3 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 84,1 | 84,6 | 83,3 | 87,5 | 100 | 83,3 | 78,6 |
| | 60-64 ans | 84,3 | 95,2 | 76,7 | 80 | 88,9 | 100 | 71,4 |
| | 65-69 ans | 86 | 84 | 88 | 66,7 | 100 | 89,5 | 81,3 |
| | 70-74 ans | 92,2 | 93,3 | 90,5 | 75 | 100 | 96,2 | 89,5 |
| | 50-74 ans | 87,7 | 89,6 | 85,6 | 81,8 | 96,7 | 92,7 | 81,1 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 98 | 113 | 79 | 124 | 72 | 76 | 91 |
| | 55-59 ans | 105 | 106 | 104 | 152 | 57 | 86 | 118 |
| | 60-64 ans | 69 | 72 | 67 | 117 | 72 | 58 | 65 |
| | 65-69 ans | 106 | 97 | 114 | 101 | 109 | 96 | 118 |
| | 70-74 ans | 68 | 77 | 55 | 83 | 68 | 76 | 53 |
| | 50-74 ans | 88 | 91 | 84 | 120 | 81 | 79 | 85 |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 71 (56-98) | 73 (59-125) | 69.5 (56-82) | 82 (59-130) | 69.5 (60-76) | 63 (40-125) | 135.5 |
| | 55-59 ans | 74 (43-99) | 74 (44-93) | 72 (42-101) | 64.5 (41.5-267) | 46.5 (37-76.5) | 74 (60-82) | 82.5 (47-160) |
| | 60-64 ans | 63 (44-93) | 68 (50-93) | 59 (42-91) | 111 (98-118) | 58 (51-81) | 58.5 (43.5-70) | 62.5 (39-92) |
| | 65-69 ans | 71 (43-108) | 62 (45-108) | 71 (42-107) | 61.5 (45-76) | 71 (48-99) | 62 (43-111) | 74.5 (38-111) |
| | 70-74 ans | 56 (34-87) | 66 (42-97) | 48 (28-64) | 50.5 (35.5-129.5) | 67.5 (62-73) | 69.5 (44-97) | 48 (24-64) |
| | 50-74 ans | 66.5 (43-97) | 69 (45-100) | 62 (42-93) | 76 (45-118) | 65 (51-81) | 66.5 (44-93) | 59 (36-93) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 8 | 7,1 | 9,1 | 9,1 | 14,3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3,9 | 3,7 | 4,2 | 11,1 | 0 | 0 | 5,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,9 | 0 | 3,6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3,3 | 2,6 | 4,5 | 0 | 33,3 | 3 | 0 |
| | 50-74 ans | 2,9 | 2,3 | 3,4 | 5,1 | 8,8 | 1,1 | 1,2 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 98 | 100 | 96,7 | 100 | 100 | 100 | 95,2 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 98 | 100 | 95,2 | 100 | 100 | 100 | 94,7 |
| | 50-74 ans | 99,1 | 100 | 98,1 | 100 | 100 | 100 | 97,3 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 60,9 | 53,8 | 70 | 40 | 66,7 | 100 | 75 |
| | 55-59 ans | 53,3 | 46,2 | 63,2 | 25 | 80 | 55,6 | 57,1 |
| | 60-64 ans | 60,8 | 66,7 | 56,7 | 60 | 55,6 | 68,8 | 57,1 |
| | 65-69 ans | 50 | 40 | 60 | 16,7 | 55,6 | 47,4 | 62,5 |
| | 70-74 ans | 49,1 | 50 | 47,6 | 40 | 50 | 51,9 | 47,4 |
| | 50-74 ans | 54,1 | 50,4 | 58,1 | 35,3 | 61,3 | 56,6 | 56,8 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 4,3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| | 55-59 ans | 6,7 | 7,7 | 5,3 | 12,5 | 0 | 5,6 | 7,1 |
| | 60-64 ans | 7,8 | 4,8 | 10 | 0 | 22,2 | 6,3 | 4,8 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3,8 | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
| | 50-74 ans | 4,5 | 2,6 | 6,7 | 2,9 | 6,5 | 2,4 | 6,8 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 3,8 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1,9 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| | 50-74 ans | 0,9 | 0,9 | 1 | 2,9 | 0 | 0 | 1,4 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 13 | 23,1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6,7 | 7,7 | 5,3 | 25 | 0 | 0 | 7,1 |
| | 60-64 ans | 9,8 | 9,5 | 10 | 20 | 22,2 | 6,3 | 4,8 |
| | 65-69 ans | 16 | 16 | 16 | 50 | 11,1 | 5,3 | 18,8 |
| | 70-74 ans | 11,3 | 15,6 | 4,8 | 40 | 0 | 11,1 | 5,3 |
| | 50-74 ans | 11,3 | 13,7 | 8,6 | 32,4 | 9,7 | 6 | 8,1 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 8,7 | 15,4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 8,9 | 7,7 | 10,5 | 25 | 20 | 0 | 7,1 |
| | 60-64 ans | 9,8 | 19 | 3,3 | 20 | 0 | 18,8 | 4,8 |
| | 65-69 ans | 14 | 24 | 4 | 16,7 | 0 | 26,3 | 6,3 |
| | 70-74 ans | 17 | 15,6 | 19 | 0 | 50 | 18,5 | 15,8 |
| | 50-74 ans | 12,2 | 16,2 | 7,6 | 17,6 | 6,5 | 15,7 | 8,1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 13 | 7,7 | 20 | 10 | 33,3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 11,1 | 11,5 | 10,5 | 0 | 0 | 16,7 | 14,3 |
| | 60-64 ans | 7,8 | 0 | 13,3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| | 65-69 ans | 14 | 16 | 12 | 16,7 | 33,3 | 15,8 | 0 |
| | 70-74 ans | 9,4 | 12,5 | 4,8 | 20 | 0 | 11,1 | 5,3 |
| | 50-74 ans | 10,8 | 10,3 | 11,4 | 8,8 | 16,1 | 10,8 | 9,5 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6,7 | 7,7 | 5,3 | 0 | 0 | 11,1 | 7,1 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| | 65-69 ans | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5,3 | 12,5 |
| | 70-74 ans | 3,8 | 3,1 | 4,8 | 0 | 0 | 3,7 | 5,3 |
| | 50-74 ans | 4,1 | 3,4 | 4,8 | 0 | 0 | 4,8 | 6,8 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,9 | 4,2 | 0 | 6,2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3,2 | 4 | 2,5 | 10,6 | 2,5 | 0 | 2,5 |
| | 60-64 ans | 3,5 | 4,7 | 2,5 | 5,4 | 5,2 | 4,4 | 1,6 |
| | 65-69 ans | 5,5 | 8,3 | 3,3 | 16,4 | 3,9 | 6,2 | 3,1 |
| | 70-74 ans | 6,8 | 9,5 | 4,4 | 14 | 4,4 | 8,8 | 4,4 |
| | 50-74 ans | 4,1 | 6,1 | 2,5 | 8,8 | 2,3 | 4,8 | 2,5 |
| 50-74 ans ** | 3,9 | 5,6 | 2,3 | . | . | . | . | |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1,7 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,8 | 2 | 1,7 | 5,3 | 2,5 | 0 | 1,3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 1,7 | 3,1 | 0,6 | 2,7 | 0 | 3,3 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 2,6 | 5 | 0,7 | 4,1 | 0 | 5,2 | 0,8 |
| | 70-74 ans | 4,1 | 4,8 | 3,5 | 0 | 4,4 | 5,5 | 3,3 |
| | 50-74 ans | 2,1 | 3,3 | 1,2 | 3,1 | 0,9 | 3,4 | 1,3 |
| | 50-74 ans ** | 2 | 3 | 1,2 | . | . | . | . |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1,7 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,4 | 1 | 1,7 | 2,6 | 2,5 | 0 | 1,3 |
| | 60-64 ans | 1 | 2,4 | 0 | 2,7 | 0 | 2,2 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,5 | 3,3 | 0 | 4,1 | 0 | 3,1 | 0 |
| | 70-74 ans | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 0 | 4,4 | 4,4 | 3,3 |
| | 50-74 ans | 1,6 | 2,4 | 0,9 | 2,6 | 0,9 | 2,4 | 0,8 |
| | 50-74 ans ** | 1,5 | 2,2 | 0,9 | . | . | . | . |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1,7 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,8 | 2 | 1,7 | 5,3 | 2,5 | 0 | 1,3 |
| | 60-64 ans | 1 | 2,4 | 0 | 2,7 | 0 | 2,2 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,5 | 3,3 | 0 | 4,1 | 0 | 3,1 | 0 |
| | 70-74 ans | 4,1 | 3,8 | 4,4 | 0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| | 50-74 ans | 1,7 | 2,6 | 1 | 3,1 | 0,9 | 2,4 | 1,1 |
| | 50-74 ans ** | 1,7 | 2,4 | 1,1 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 1,2 | 2,1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,3 | 3 | 1,7 | 0 | 0 | 4,7 | 2,5 |
| | 60-64 ans | 1,4 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 3,3 |
| | 65-69 ans | 2,6 | 3,3 | 2 | 4,1 | 11,8 | 3,1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2,3 | 3,8 | 0,9 | 7 | 0 | 3,3 | 1,1 |
| | 50-74 ans | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 2,3 | 2,4 | 1,5 |
| | 50-74 ans ** | 1,7 | 2 | 1,7 | . | . | . | . |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009