

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	59 232	27 392	31 840	15 963	17 861	11 429	13 979
	55-59 ans	53 879	24 293	29 586	4 030	4 629	20 263	24 957
	60-64 ans	63 660	28 299	35 361	4 370	4 917	23 929	30 444
	65-69 ans	47 294	21 271	26 023	2 520	2 612	18 751	23 411
	70-74 ans	39 325	17 248	22 077	1 690	1 902	15 558	20 175
	<b>50-74 ans</b>	<b>263 390</b>	<b>118 503</b>	<b>144 887</b>	<b>28 573</b>	<b>31 921</b>	<b>89 930</b>	<b>112 966</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	3 196	1 569	1 627	1 020	1 062	549	565
	55-59 ans	2 660	1 222	1 438	306	321	916	1 117
	60-64 ans	3 022	1 416	1 606	329	339	1 087	1 267
	65-69 ans	2 335	1 050	1 285	202	224	848	1 061
	70-74 ans	2 279	925	1 354	157	195	768	1 159
	<b>50-74 ans</b>	<b>13 492</b>	<b>6 182</b>	<b>7 310</b>	<b>2 014</b>	<b>2 141</b>	<b>4 168</b>	<b>5 169</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	2 314	1 141	1 173	701	713	440	460
	55-59 ans	1 971	900	1 071	183	191	717	880
	60-64 ans	2 322	1 106	1 216	215	210	891	1 006
	65-69 ans	1 832	834	998	123	142	711	856
	70-74 ans	1 748	708	1 040	94	125	614	915
	<b>50-74 ans</b>	<b>10 187</b>	<b>4 689</b>	<b>5 498</b>	<b>1 316</b>	<b>1 381</b>	<b>3 373</b>	<b>4 117</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	882	428	454	319	349	109	105
	55-59 ans	689	322	367	123	130	199	237
	60-64 ans	700	310	390	114	129	196	261
	65-69 ans	503	216	287	79	82	137	205
	70-74 ans	531	217	314	63	70	154	244
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 305</b>	<b>1 493</b>	<b>1 812</b>	<b>698</b>	<b>760</b>	<b>795</b>	<b>1 052</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	58 350	26 964	31 386	15 644	17 512	11 320	13 874
	55-59 ans	53 190	23 971	29 219	3 907	4 499	20 064	24 720
	60-64 ans	62 960	27 989	34 971	4 256	4 788	23 733	30 183
	65-69 ans	46 791	21 055	25 736	2 441	2 530	18 614	23 206
	70-74 ans	38 794	17 031	21 763	1 627	1 832	15 404	19 931
	<b>50-74 ans</b>	<b>260 085</b>	<b>117 010</b>	<b>143 075</b>	<b>27 875</b>	<b>31 161</b>	<b>89 135</b>	<b>111 914</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 042	558	484	352	298	206	186
	55-59 ans	1 050	526	524	125	104	401	420
	60-64 ans	1 337	689	648	148	125	541	523

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1 085	524	561	88	72	436	489
	70-74 ans	991	492	499	74	57	418	442
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 505</b>	<b>2 789</b>	<b>2 716</b>	<b>787</b>	<b>656</b>	<b>2 002</b>	<b>2 060</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 040	557	483	351	297	206	186
	55-59 ans	1 048	525	523	125	104	400	419
	60-64 ans	1 334	687	647	148	125	539	522
	65-69 ans	1 082	522	560	88	71	434	489
	70-74 ans	981	484	497	73	56	411	441
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 485</b>	<b>2 775</b>	<b>2 710</b>	<b>785</b>	<b>653</b>	<b>1 990</b>	<b>2 057</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	902	477	425	299	261	178	164
	55-59 ans	901	454	447	97	82	357	365
	60-64 ans	1 146	588	558	120	100	468	458
	65-69 ans	944	467	477	75	58	392	419
	70-74 ans	838	419	419	59	40	360	379
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 731</b>	<b>2 405</b>	<b>2 326</b>	<b>650</b>	<b>541</b>	<b>1 755</b>	<b>1 785</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	873	463	410	290	252	173	158
	55-59 ans	873	438	435	91	78	347	357
	60-64 ans	1 101	564	537	113	93	451	444
	65-69 ans	893	441	452	67	54	374	398
	70-74 ans	785	393	392	55	35	338	357
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 525</b>	<b>2 299</b>	<b>2 226</b>	<b>616</b>	<b>512</b>	<b>1 683</b>	<b>1 714</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	897	476	421	299	258	177	163
	55-59 ans	897	452	445	96	82	356	363
	60-64 ans	1 137	585	552	119	98	466	454
	65-69 ans	930	462	468	75	57	387	411
	70-74 ans	828	416	412	59	39	357	373
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 689</b>	<b>2 391</b>	<b>2 298</b>	<b>648</b>	<b>534</b>	<b>1 743</b>	<b>1 764</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	1	4	0	3	1	1
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	9	3	6	1	2	2	4
	65-69 ans	14	5	9	0	1	5	8
	70-74 ans	10	3	7	0	1	3	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	5	1	4	0	2	1	2
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	5,7	5,1	6,4	5,9	4,8	4,0
	55-59 ans	4,9	5,0	4,9	7,6	6,9	4,5	4,5
	60-64 ans	4,7	5,0	4,5	7,5	6,9	4,5	4,2
	65-69 ans	4,9	4,9	4,9	8,0	8,6	4,5	4,5
	70-74 ans	5,8	5,4	6,1	9,3	10,3	4,9	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,7</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,6	1,4	2,0	2,0	1,0	0,8
	55-59 ans	1,3	1,3	1,2	3,1	2,8	1,0	0,9
	60-64 ans	1,1	1,1	1,1	2,6	2,6	0,8	0,9
	65-69 ans	1,1	1,0	1,1	3,1	3,1	0,7	0,9
	70-74 ans	1,4	1,3	1,4	3,7	3,7	1,0	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,4	72,7	72,1	68,7	67,1	80,1	81,4
	55-59 ans	74,1	73,6	74,5	59,8	59,5	78,3	78,8
	60-64 ans	76,8	78,1	75,7	65,3	61,9	82,0	79,4
	65-69 ans	78,5	79,4	77,7	60,9	63,4	83,8	80,7
	70-74 ans	76,7	76,5	76,8	59,9	64,1	79,9	78,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>75,5</b>	<b>75,8</b>	<b>75,2</b>	<b>65,3</b>	<b>64,5</b>	<b>80,9</b>	<b>79,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,1	1,5	2,3	1,7	1,8	1,3
	55-59 ans	2,0	2,2	1,8	3,2	2,3	2,0	1,7
	60-64 ans	2,1	2,5	1,9	3,5	2,6	2,3	1,7
	65-69 ans	2,3	2,5	2,2	3,6	2,8	2,3	2,1
	70-74 ans	2,6	2,9	2,3	4,5	3,1	2,7	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,8	99,8	99,8	99,7	99,7	100,0	100,0
	55-59 ans	99,8	99,8	99,8	100,0	100,0	99,8	99,8
	60-64 ans	99,8	99,7	99,8	100,0	100,0	99,6	99,8
	65-69 ans	99,7	99,6	99,8	100,0	98,6	99,5	100,0
	70-74 ans	99,0	98,4	99,6	98,6	98,2	98,3	99,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,5</b>	<b>99,8</b>	<b>99,7</b>	<b>99,5</b>	<b>99,4</b>	<b>99,9</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,7	85,6	88,0	85,2	87,9	86,4	88,2
	55-59 ans	86,0	86,5	85,5	77,6	78,8	89,3	87,1
	60-64 ans	85,9	85,6	86,2	81,1	80,0	86,8	87,7
	65-69 ans	87,2	89,5	85,2	85,2	81,7	90,3	85,7
	70-74 ans	85,4	86,6	84,3	80,8	71,4	87,6	85,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>86,3</b>	<b>86,7</b>	<b>85,8</b>	<b>82,8</b>	<b>82,8</b>	<b>88,2</b>	<b>86,8</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,8	97,1	96,5	97,0	96,6	97,2	96,3
	55-59 ans	96,9	96,5	97,3	93,8	95,1	97,2	97,8
	60-64 ans	96,1	95,9	96,2	94,2	93,0	96,4	96,9
	65-69 ans	94,6	94,4	94,8	89,3	93,1	95,4	95,0
	70-74 ans	93,7	93,8	93,6	93,2	87,5	93,9	94,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,6</b>	<b>95,6</b>	<b>95,7</b>	<b>94,8</b>	<b>94,6</b>	<b>95,9</b>	<b>96,0</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)