

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8 534	3 070	5 464	2 596	4 395	474	1 069
	55-59 ans	6 629	2 323	4 306	1 467	2 320	856	1 986
	60-64 ans	6 434	2 281	4 153	1 162	1 817	1 119	2 336
	65-69 ans	5 517	2 060	3 457	759	1 169	1 301	2 288
	70-74 ans	4 143	1 538	2 605	567	750	971	1 855
	50-74 ans	31 257	11 272	19 985	6 551	10 451	4 721	9 534
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 007	431	576	389	476	42	100
	55-59 ans	844	341	503	262	349	79	154
	60-64 ans	907	395	512	240	290	155	222
	65-69 ans	864	341	523	167	227	174	296
	70-74 ans	745	314	431	140	168	174	263
	50-74 ans	4 367	1 822	2 545	1 198	1 510	624	1 035
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	618	254	364	220	288	34	76
	55-59 ans	532	205	327	151	210	54	117
	60-64 ans	582	239	343	129	175	110	168
	65-69 ans	553	218	335	93	126	125	209
	70-74 ans	444	199	245	76	74	123	171
	50-74 ans	2 729	1 115	1 614	669	873	446	741
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	389	177	212	169	188	8	24
	55-59 ans	312	136	176	111	139	25	37
	60-64 ans	325	156	169	111	115	45	54
	65-69 ans	311	123	188	74	101	49	87
	70-74 ans	301	115	186	64	94	51	92
	50-74 ans	1 638	707	931	529	637	178	294
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 145	2 893	5 252	2 427	4 207	466	1 045
	55-59 ans	6 317	2 187	4 130	1 356	2 181	831	1 949
	60-64 ans	6 109	2 125	3 984	1 051	1 702	1 074	2 282
	65-69 ans	5 206	1 937	3 269	685	1 068	1 252	2 201
	70-74 ans	3 842	1 423	2 419	503	656	920	1 763
	50-74 ans	29 619	10 565	19 054	6 022	9 814	4 543	9 240
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	88	36	52	31	50	5	2
	55-59 ans	73	35	38	25	26	10	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	69	34	35	16	13	18	22
	65-69 ans	59	25	34	11	15	14	19
	70-74 ans	59	31	28	10	10	21	18
	50-74 ans	348	161	187	93	114	68	73
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	88	36	52	31	50	5	2
	55-59 ans	73	35	38	25	26	10	12
	60-64 ans	68	33	35	16	13	17	22
	65-69 ans	59	25	34	11	15	14	19
	70-74 ans	58	31	27	10	10	21	17
	50-74 ans	346	160	186	93	114	67	72
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	72	30	42	26	40	4	2
	55-59 ans	63	30	33	20	21	10	12
	60-64 ans	56	25	31	12	10	13	21
	65-69 ans	48	20	28	8	13	12	15
	70-74 ans	52	27	25	9	8	18	17
	50-74 ans	291	132	159	75	92	57	67
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	47	16	31	14	29	2	2
	55-59 ans	39	18	21	12	12	6	9
	60-64 ans	37	14	23	4	4	10	19
	65-69 ans	34	16	18	6	8	10	10
	70-74 ans	28	14	14	6	3	8	11
	50-74 ans	185	78	107	42	56	36	51
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	72	30	42	26	40	4	2
	55-59 ans	63	30	33	20	21	10	12
	60-64 ans	56	25	31	12	10	13	21
	65-69 ans	47	20	27	8	13	12	14
	70-74 ans	52	27	25	9	8	18	17
	50-74 ans	290	132	158	75	92	57	66
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	11,8	14,0	10,5	15,0	10,8	8,9	9,4
	55-59 ans	12,7	14,7	11,7	17,9	15,0	9,2	7,8
	60-64 ans	14,1	17,3	12,3	20,7	16,0	13,9	9,5
	65-69 ans	15,7	16,6	15,1	22,0	19,4	13,4	12,9
	70-74 ans	18,0	20,4	16,5	24,7	22,4	17,9	14,2
	50-74 ans	14,0	16,2	12,7	18,3	14,4	13,2	10,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,6	5,8	3,9	6,5	4,3	1,7	2,2
	55-59 ans	4,7	5,9	4,1	7,6	6,0	2,9	1,9
	60-64 ans	5,1	6,8	4,1	9,6	6,3	4,0	2,3
	65-69 ans	5,6	6,0	5,4	9,7	8,6	3,8	3,8
	70-74 ans	7,3	7,5	7,1	11,3	12,5	5,3	5,0
	50-74 ans	5,2	6,3	4,7	8,1	6,1	3,8	3,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61,4	58,9	63,2	56,6	60,5	81,0	76,0
	55-59 ans	63,0	60,1	65,0	57,6	60,2	68,4	76,0
	60-64 ans	64,2	60,5	67,0	53,8	60,3	71,0	75,7
	65-69 ans	64,0	63,9	64,1	55,7	55,5	71,8	70,6
	70-74 ans	59,6	63,4	56,8	54,3	44,0	70,7	65,0
	50-74 ans	62,5	61,2	63,4	55,8	57,8	71,5	71,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,1	1,2	1,0	1,3	1,2	1,1	0,2
	55-59 ans	1,2	1,6	0,9	1,8	1,2	1,2	0,6
	60-64 ans	1,1	1,6	0,9	1,5	0,8	1,7	1,0
	65-69 ans	1,1	1,3	1,0	1,6	1,4	1,1	0,9
	70-74 ans	1,5	2,2	1,2	2,0	1,5	2,3	1,0
	50-74 ans	1,2	1,5	1,0	1,5	1,2	1,5	0,8
50-74 ans **	1,3	1,5	1,0	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,6	97,1	100,0	100,0	100,0	94,4	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	98,3	100,0	96,4	100,0	100,0	100,0	94,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,4	99,4	99,5	100,0	100,0	98,5	98,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,8	83,3	80,8	83,9	80,0	80,0	100,0
	55-59 ans	86,3	85,7	86,8	80,0	80,8	100,0	100,0
	60-64 ans	82,4	75,8	88,6	75,0	76,9	76,5	95,5
	65-69 ans	81,4	80,0	82,4	72,7	86,7	85,7	78,9
	70-74 ans	89,7	87,1	92,6	90,0	80,0	85,7	100,0
	50-74 ans	84,1	82,5	85,5	80,6	80,7	85,1	93,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	65,3	53,3	73,8	53,8	72,5	50,0	100,0
	55-59 ans	61,9	60,0	63,6	60,0	57,1	60,0	75,0
	60-64 ans	66,1	56,0	74,2	33,3	40,0	76,9	90,5
	65-69 ans	70,8	80,0	64,3	75,0	61,5	83,3	66,7
	70-74 ans	53,8	51,9	56,0	66,7	37,5	44,4	64,7
	50-74 ans	63,6	59,1	67,3	56,0	60,9	63,2	76,1

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)