

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 328	655	673	427	423	228	250
	55-59 ans	1 365	677	688	220	195	457	493
	60-64 ans	1 875	906	969	257	266	649	703
	65-69 ans	1 684	795	889	179	190	616	699
	70-74 ans	1 543	760	783	162	148	598	635
	50-74 ans	7 795	3 793	4 002	1 245	1 222	2 548	2 780
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 347	664	683	436	430	228	253
	55-59 ans	1 386	684	702	222	200	462	502
	60-64 ans	1 905	919	986	261	271	658	715
	65-69 ans	1 720	813	907	187	196	626	711
	70-74 ans	1 582	773	809	165	155	608	654
	50-74 ans	7 940	3 853	4 087	1 271	1 252	2 582	2 835
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	784	334	450	222	275	112	175
	55-59 ans	783	335	448	96	117	239	331
	60-64 ans	1 049	404	645	124	171	280	474
	65-69 ans	854	336	518	75	110	261	408
	70-74 ans	759	307	452	58	81	249	371
	50-74 ans	4 229	1 716	2 513	575	754	1 141	1 759
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	58	30	28	22	17	8	11
	55-59 ans	45	24	21	10	7	14	14
	60-64 ans	82	47	35	9	16	38	19
	65-69 ans	58	26	32	9	9	17	23
	70-74 ans	37	20	17	7	3	13	14
	50-74 ans	280	147	133	57	52	90	81
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	8	6	2	6	2	0	0
	55-59 ans	8	4	4	1	3	3	1
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	7	3	4	0	0	3	4
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	32	18	14	8	6	10	8
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	170	96	74	61	48	35	26
	55-59 ans	180	99	81	36	27	63	54

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	267	152	115	37	35	115	80
	65-69 ans	267	149	118	32	21	117	97
	70-74 ans	247	123	124	28	26	95	98
	50-74 ans	1 131	619	512	194	157	425	355
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	164	102	62	60	46	42	16
	55-59 ans	167	112	55	43	19	69	36
	60-64 ans	265	175	90	51	17	124	73
	65-69 ans	273	156	117	28	23	128	94
	70-74 ans	272	173	99	41	16	132	83
	50-74 ans	1 141	718	423	223	121	495	302
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	46	25	21	15	16	10	5
	55-59 ans	76	47	29	20	11	27	18
	60-64 ans	78	47	31	15	10	32	21
	65-69 ans	106	57	49	16	16	41	33
	70-74 ans	124	76	48	13	16	63	32
	50-74 ans	430	252	178	79	69	173	109
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	8	4	4	2	2	2	2
	60-64 ans	7	1	6	0	0	1	6
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	50-74 ans	28	12	16	2	2	10	14
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	31	17	14	11	11	6	3
	55-59 ans	23	16	7	5	3	11	4
	60-64 ans	43	26	17	11	8	15	9
	65-69 ans	44	26	18	7	2	19	16
	70-74 ans	41	25	16	9	4	16	12
	50-74 ans	182	110	72	43	28	67	44
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	20	11	9	10	5	1	4
	55-59 ans	19	6	13	1	6	5	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	21	11	10	3	4	8	6
	65-69 ans	30	18	12	9	6	9	6
	70-74 ans	25	9	16	2	6	7	10
	50-74 ans	115	55	60	25	27	30	33
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	334	198	136	121	94	77	42
	55-59 ans	347	211	136	79	46	132	90
	60-64 ans	535	328	207	88	54	240	153
	65-69 ans	541	306	235	60	44	246	191
	70-74 ans	522	299	223	70	42	229	181
	50-74 ans	2 279	1 342	937	418	280	924	657
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	164	102	62	60	46	42	16
	55-59 ans	167	112	55	43	19	69	36
	60-64 ans	265	175	90	51	17	124	73
	65-69 ans	273	156	117	28	23	128	94
	70-74 ans	272	173	99	41	16	132	83
	50-74 ans	1 141	718	423	223	121	495	302
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	81	43	38	26	28	17	10
	55-59 ans	84	63	21	33	8	30	13
	60-64 ans	127	84	43	31	12	53	31
	65-69 ans	122	66	56	16	16	50	40
	70-74 ans	157	105	52	31	10	74	42
	50-74 ans	571	361	210	137	74	224	136
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	46	25	21	15	16	10	5
	55-59 ans	76	47	29	20	11	27	18
	60-64 ans	78	47	31	15	10	32	21
	65-69 ans	106	57	49	16	16	41	33
	70-74 ans	124	76	48	13	16	63	32
	50-74 ans	430	252	178	79	69	173	109

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	98,6	98,8	97,9	98,8	100,0	98,8
	55-59 ans	98,6	99,1	98,1	99,5	97,5	98,9	98,4
	60-64 ans	99,0	99,1	99,0	98,8	98,5	99,2	99,2
	65-69 ans	98,6	98,4	98,8	95,7	97,4	99,2	99,1
	70-74 ans	98,5	99,1	98,0	99,4	97,4	99,0	98,1
	50-74 ans	98,7	98,9	98,6	98,3	98,2	99,2	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,2	50,3	65,9	50,9	64,0	49,1	69,2
	55-59 ans	56,5	49,0	63,8	43,2	58,5	51,7	65,9
	60-64 ans	55,1	44,0	65,4	47,5	63,1	42,6	66,3
	65-69 ans	49,7	41,3	57,1	40,1	56,1	41,7	57,4
	70-74 ans	48,0	39,7	55,9	35,2	52,3	41,0	56,7
	50-74 ans	53,3	44,5	61,5	45,2	60,2	44,2	62,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,3	4,5	4,1	5,0	4,0	3,5	4,3
	55-59 ans	3,2	3,5	3,0	4,5	3,5	3,0	2,8
	60-64 ans	4,3	5,1	3,5	3,4	5,9	5,8	2,7
	65-69 ans	3,4	3,2	3,5	4,8	4,6	2,7	3,2
	70-74 ans	2,3	2,6	2,1	4,2	1,9	2,1	2,1
	50-74 ans	3,5	3,8	3,3	4,5	4,2	3,5	2,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0,9	0,3	1,4	0,5	0,0	0,0
	55-59 ans	0,6	0,6	0,6	0,5	1,5	0,6	0,2
	60-64 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	0,4	0,5	0,3
	65-69 ans	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,5	0,6
	70-74 ans	0,2	0,3	0,1	0,6	0,0	0,2	0,2
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	0,6	0,5	0,4	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,6	14,5	10,8	14,0	11,2	15,4	10,3
	55-59 ans	13,0	14,5	11,5	16,2	13,5	13,6	10,8
	60-64 ans	14,0	16,5	11,7	14,2	12,9	17,5	11,2
	65-69 ans	15,5	18,3	13,0	17,1	10,7	18,7	13,6
	70-74 ans	15,6	15,9	15,3	17,0	16,8	15,6	15,0
	50-74 ans	14,2	16,1	12,5	15,3	12,5	16,5	12,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	12,2	15,4	9,1	13,8	10,7	18,4	6,3
	55-59 ans	12,0	16,4	7,8	19,4	9,5	14,9	7,2
	60-64 ans	13,9	19,0	9,1	19,5	6,3	18,8	10,2
	65-69 ans	15,9	19,2	12,9	15,0	11,7	20,4	13,2
	70-74 ans	17,2	22,4	12,2	24,8	10,3	21,7	12,7
	50-74 ans	14,4	18,6	10,3	17,5	9,7	19,2	10,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,4	3,8	3,1	3,4	3,7	4,4	2,0
	55-59 ans	5,5	6,9	4,1	9,0	5,5	5,8	3,6
	60-64 ans	4,1	5,1	3,1	5,7	3,7	4,9	2,9
	65-69 ans	6,2	7,0	5,4	8,6	8,2	6,5	4,6
	70-74 ans	7,8	9,8	5,9	7,9	10,3	10,4	4,9
	50-74 ans	5,4	6,5	4,4	6,2	5,5	6,7	3,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,4	0,4
	55-59 ans	0,6	0,6	0,6	0,9	1,0	0,4	0,4
	60-64 ans	0,4	0,1	0,6	0,0	0,0	0,2	0,8
	65-69 ans	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3
	70-74 ans	0,5	0,6	0,4	0,0	0,0	0,8	0,5
	50-74 ans	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,3	2,6	2,0	2,5	2,6	2,6	1,2
	55-59 ans	1,7	2,3	1,0	2,3	1,5	2,4	0,8
	60-64 ans	2,3	2,8	1,7	4,2	3,0	2,3	1,3
	65-69 ans	2,6	3,2	2,0	3,7	1,0	3,0	2,3
	70-74 ans	2,6	3,2	2,0	5,5	2,6	2,6	1,8
	50-74 ans	2,3	2,9	1,8	3,4	2,2	2,6	1,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,5	1,7	1,3	2,3	1,2	0,4	1,6
	55-59 ans	1,4	0,9	1,9	0,5	3,0	1,1	1,4
	60-64 ans	1,1	1,2	1,0	1,1	1,5	1,2	0,8
	65-69 ans	1,7	2,2	1,3	4,8	3,1	1,4	0,8
	70-74 ans	1,6	1,2	2,0	1,2	3,9	1,2	1,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1,4	1,4	1,5	2,0	2,2	1,2	1,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,3	5,7	3,2	5,4	3,6	6,0	2,6
	55-59 ans	4,9	6,9	3,4	9,9	4,7	5,8	3,0
	60-64 ans	6,4	8,9	4,4	10,2	5,3	8,6	4,1
	65-69 ans	7,8	10,0	6,1	10,0	6,2	10,0	6,1
	70-74 ans	9,4	12,0	7,2	16,6	7,9	11,1	7,1
	50-74 ans	6,4	8,5	4,7	8,5	4,8	8,5	4,7
	50-74 ans **	6,3	8,2	4,6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2,9	1,5	2,7	1,8	3,3	1,0
	55-59 ans	2,4	3,7	1,4	5,4	1,9	3,0	1,2
	60-64 ans	3,2	4,8	1,9	5,9	1,7	4,4	2,0
	65-69 ans	4,0	5,1	3,0	4,6	3,3	5,2	3,0
	70-74 ans	4,9	7,0	3,2	9,7	3,0	6,4	3,2
	50-74 ans	3,2	4,5	2,1	4,5	2,1	4,6	2,1
	50-74 ans **	3,2	4,4	2,0
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	1,2	0,9	1,2	1,1	1,3	0,6
	55-59 ans	1,2	2,1	0,5	4,1	0,8	1,3	0,4
	60-64 ans	1,5	2,3	0,9	3,6	1,2	1,9	0,8
	65-69 ans	1,8	2,2	1,5	2,7	2,3	2,0	1,3
	70-74 ans	2,8	4,2	1,7	7,3	1,9	3,6	1,6
	50-74 ans	1,6	2,3	1,1	2,8	1,3	2,1	1,0
	50-74 ans **	1,6	2,2	1,0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,7	0,5	0,7	0,6	0,8	0,3
	55-59 ans	1,1	1,5	0,7	2,5	1,1	1,2	0,6
	60-64 ans	0,9	1,3	0,7	1,7	1,0	1,1	0,6
	65-69 ans	1,5	1,9	1,3	2,7	2,3	1,7	1,1
	70-74 ans	2,2	3,1	1,6	3,1	3,0	3,1	1,2
	50-74 ans	1,2	1,6	0,9	1,6	1,2	1,6	0,8
	50-74 ans **	1,2	1,5	0,9

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)