

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	28616	13306	15310	7682	8689	5624	6621
	55-59 ans	25689	11517	14172	1842	2052	9675	12120
	60-64 ans	26611	12086	14525	1594	1413	10492	13112
	65-69 ans	20258	9194	11064	920	736	8274	10328
	70-74 ans	17150	7772	9378	661	490	7111	8888
	50-74 ans	118324	53875	64449	12699	13380	41176	51069
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	770	361	409	233	278	128	131
	55-59 ans	732	325	407	80	104	245	303
	60-64 ans	829	361	468	66	85	295	383
	65-69 ans	685	299	386	48	42	251	344
	70-74 ans	674	284	390	39	32	245	358
	50-74 ans	3690	1630	2060	466	541	1164	1519
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	593	285	308	174	204	111	104
	55-59 ans	587	255	332	55	71	200	261
	60-64 ans	682	295	387	43	55	252	332
	65-69 ans	560	256	304	39	24	217	280
	70-74 ans	541	222	319	23	21	199	298
	50-74 ans	2963	1313	1650	334	375	979	1275
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	177	76	101	59	74	17	27
	55-59 ans	145	70	75	25	33	45	42
	60-64 ans	147	66	81	23	30	43	51
	65-69 ans	125	43	82	9	18	34	64
	70-74 ans	133	62	71	16	11	46	60
	50-74 ans	727	317	410	132	166	185	244
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	28439	13230	15209	7623	8615	5607	6594
	55-59 ans	25544	11447	14097	1817	2019	9630	12078
	60-64 ans	26464	12020	14444	1571	1383	10449	13061
	65-69 ans	20133	9151	10982	911	718	8240	10264
	70-74 ans	17017	7710	9307	645	479	7065	8828

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	117597	53558	64039	12567	13214	40991	50825
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	437	240	197	141	102	99	95
	55-59 ans	453	241	212	44	38	197	174
	60-64 ans	521	264	257	55	28	209	229
	65-69 ans	436	212	224	29	18	183	206
	70-74 ans	400	183	217	21	7	162	210
	50-74 ans	2247	1140	1107	290	193	850	914
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	429	238	191	140	100	98	91
	55-59 ans	437	232	205	42	37	190	168
	60-64 ans	500	254	246	52	28	202	218
	65-69 ans	423	206	217	26	16	180	201
	70-74 ans	385	175	210	20	7	155	203
	50-74 ans	2174	1105	1069	280	188	825	881
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	392	219	173	125	92	94	81
	55-59 ans	404	213	191	36	33	177	158
	60-64 ans	466	230	236	45	27	185	209
	65-69 ans	395	190	205	22	16	168	189
	70-74 ans	359	166	193	18	7	148	186
	50-74 ans	2016	1018	998	246	175	772	823
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	380	211	169	123	89	88	80
	55-59 ans	390	208	182	36	33	172	149
	60-64 ans	453	224	229	44	25	180	204
	65-69 ans	382	183	199	21	16	162	183
	70-74 ans	333	152	181	15	6	137	175
	50-74 ans	1938	978	960	239	169	739	791
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	13	10	3	4	0	6	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	0	0	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	390	217	173	124	92	93	81
	55-59 ans	398	211	187	36	33	175	154
	60-64 ans	462	228	234	45	27	183	207
	65-69 ans	391	188	203	21	16	167	187
	70-74 ans	351	166	185	18	6	148	179
	50-74 ans	1992	1010	982	244	174	766	808
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	6	2	4	0	0	2	4
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	8	0	8	0	1	0	7
	50-74 ans	24	8	16	2	1	6	15
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	13	4	9	1	1	3	8
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	386	217	169	125	89	92	80

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	399	212	187	36	33	176	154
	60-64 ans	464	230	234	45	27	185	207
	65-69 ans	390	187	203	22	16	165	187
	70-74 ans	353	161	192	18	7	143	185
	50-74 ans	1992	1007	985	246	172	761	813
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	392	219	173	125	92	94	81
	55-59 ans	404	213	191	36	33	177	158
	60-64 ans	470	231	239	45	27	186	212
	65-69 ans	398	191	207	23	17	168	190
	70-74 ans	365	168	197	18	7	150	190
	50-74 ans	2029	1022	1007	247	176	775	831
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	216	106	110	65	61	41	49
	55-59 ans	201	98	103	16	21	82	82
	60-64 ans	241	104	137	20	17	84	120
	65-69 ans	200	71	129	8	9	63	120
	70-74 ans	167	61	106	4	4	57	102
	50-74 ans	1025	440	585	113	112	327	473
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	42	23	19	15	10	8	9
	55-59 ans	54	23	31	5	5	18	26
	60-64 ans	39	19	20	2	4	17	16
	65-69 ans	30	10	20	0	0	10	20
	70-74 ans	29	7	22	1	0	6	22
	50-74 ans	194	82	112	23	19	59	93
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	58	41	17	23	9	18	8
	55-59 ans	58	31	27	3	4	28	23
	60-64 ans	65	38	27	6	2	32	25
	65-69 ans	63	34	29	5	1	29	28
	70-74 ans	62	34	28	3	0	31	28
	50-74 ans	306	178	128	40	16	138	112
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	55	36	19	17	6	19	13
	55-59 ans	68	44	24	6	2	38	22
	60-64 ans	98	56	42	15	3	41	39
	65-69 ans	68	50	18	7	7	43	11
	70-74 ans	62	37	25	3	1	34	24
	50-74 ans	351	223	128	48	19	175	109
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	13	8	5	4	4	4	1
	55-59 ans	18	14	4	5	1	9	3
	60-64 ans	19	13	6	2	1	11	5
	65-69 ans	34	26	8	3	0	23	8
	70-74 ans	38	26	12	7	1	19	11
	50-74 ans	122	87	35	21	7	66	28
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	9	3	6	0	0	3	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	2	3	0	2	2	1
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	17	6	11	0	3	6	8
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	113	77	36	40	15	37	21
	55-59 ans	126	75	51	9	6	66	45
	60-64 ans	164	94	70	21	5	73	65
	65-69 ans	131	84	47	12	8	72	39
	70-74 ans	125	71	54	6	2	65	52
	50-74 ans	659	401	258	88	36	313	222
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	55	36	19	17	6	19	13
	55-59 ans	68	44	24	6	2	38	22
	60-64 ans	98	56	42	15	3	41	39
	65-69 ans	68	50	18	7	7	43	11
	70-74 ans	62	37	25	3	1	34	24
	50-74 ans	351	223	128	48	19	175	109
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	39	24	15	11	4	13	11
	55-59 ans	50	31	19	5	2	26	17
	60-64 ans	70	43	27	11	3	32	24

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	48	35	13	7	6	28	7
	70-74 ans	45	26	19	2	1	24	18
	50-74 ans	252	159	93	36	16	123	77
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	9	5	5	4	4	1
	55-59 ans	18	14	4	5	1	9	3
	60-64 ans	19	13	6	2	1	11	5
	65-69 ans	34	26	8	3	0	23	8
	70-74 ans	38	26	12	7	1	19	11
	50-74 ans	123	88	35	22	7	66	28
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	8	5	5	4	3	1
	55-59 ans	15	12	3	5	1	7	2
	60-64 ans	18	12	6	1	1	11	5
	65-69 ans	30	23	7	3	0	20	7
	70-74 ans	35	24	11	7	0	17	11
	50-74 ans	111	79	32	21	6	58	26
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	12	7	5	4	4	3	1
	55-59 ans	15	12	3	5	1	7	2
	60-64 ans	18	12	6	1	1	11	5
	65-69 ans	29	22	7	3	0	19	7
	70-74 ans	35	24	11	7	0	17	11
	50-74 ans	109	77	32	20	6	57	26
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	10	5	5	2	4	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	8	7	1	3	0	4	1
	60-64 ans	14	9	5	1	1	8	4
	65-69 ans	23	16	7	2	0	14	7
	70-74 ans	29	21	8	6	0	15	8
	50-74 ans	84	58	26	14	5	44	21
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	7	5	2	2	1	3	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	6	6	0	1	0	5	0
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	25	19	6	6	1	13	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	6	5	1	2	0	3	1
	70-74 ans	12	6	6	2	0	4	6
	50-74 ans	28	17	11	5	0	12	11
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	9	6	3	0	0	6	3
	70-74 ans	7	6	1	2	0	4	1
	50-74 ans	27	20	7	5	2	15	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	1	3	0	3	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	7	6	1	2	0	4	1
	50-74 ans	18	12	6	3	3	9	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	11	9	2	1	0	8	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	7	5	4	4	3	1
	55-59 ans	14	11	3	4	1	7	2
	60-64 ans	18	12	6	1	1	11	5
	65-69 ans	27	20	7	3	0	17	7
	70-74 ans	35	24	11	7	0	17	11
	50-74 ans	106	74	32	19	6	55	26
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	11	7	9	4	2	3
	55-59 ans	9	5	4	3	2	2	2
	60-64 ans	13	10	3	4	0	6	3
	65-69 ans	12	8	4	3	0	5	4
	70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
	50-74 ans	59	37	22	20	6	17	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,7	2,7	2,7	3	3,2	2,3	2
	55-59 ans	2,8	2,8	2,9	4,3	5,1	2,5	2,5
	60-64 ans	3,1	3	3,2	4,1	6	2,8	2,9
	65-69 ans	3,4	3,3	3,5	5,2	5,7	3	3,3
	70-74 ans	3,9	3,7	4,2	5,9	6,5	3,4	4
	50-74 ans	3,1	3	3,2	3,7	4	2,8	3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	0,3	0,4
	55-59 ans	0,6	0,6	0,5	1,4	1,6	0,5	0,3
	60-64 ans	0,6	0,5	0,6	1,4	2,1	0,4	0,4
	65-69 ans	0,6	0,5	0,7	1	2,4	0,4	0,6
	70-74 ans	0,8	0,8	0,8	2,4	2,2	0,6	0,7
	50-74 ans	0,6	0,6	0,6	1	1,2	0,4	0,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77	78,9	75,3	74,7	73,4	86,7	79,4
	55-59 ans	80,2	78,5	81,6	68,8	68,3	81,6	86,1
	60-64 ans	82,3	81,7	82,7	65,2	64,7	85,4	86,7
	65-69 ans	81,8	85,6	78,8	81,3	57,1	86,5	81,4
	70-74 ans	80,3	78,2	81,8	59	65,6	81,2	83,2
	50-74 ans	80,3	80,6	80,1	71,7	69,3	84,1	83,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,5	1,8	1,3	1,8	1,2	1,8	1,4
	55-59 ans	1,8	2,1	1,5	2,4	1,9	2	1,4
	60-64 ans	2	2,2	1,8	3,5	2	2	1,8
	65-69 ans	2,2	2,3	2	3,2	2,5	2,2	2
	70-74 ans	2,4	2,4	2,3	3,3	1,5	2,3	2,4
	50-74 ans	1,9	2,1	1,7	2,3	1,5	2,1	1,8
50-74 ans **	1,9	2,1	1,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,2	99,2	97	99,3	98	99	95,8
	55-59 ans	96,5	96,3	96,7	95,5	97,4	96,4	96,6
	60-64 ans	96	96,2	95,7	94,5	100	96,7	95,2
	65-69 ans	97	97,2	96,9	89,7	88,9	98,4	97,6
	70-74 ans	96,3	95,6	96,8	95,2	100	95,7	96,7
	50-74 ans	96,8	96,9	96,6	96,6	97,4	97,1	96,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,4	92	90,6	89,3	92	95,9	89
	55-59 ans	92,4	91,8	93,2	85,7	89,2	93,2	94
	60-64 ans	93,2	90,6	95,9	86,5	96,4	91,6	95,9
	65-69 ans	93,4	92,2	94,5	84,6	100	93,3	94
	70-74 ans	93,2	94,9	91,9	90	100	95,5	91,6
	50-74 ans	92,7	92,1	93,4	87,9	93,1	93,6	93,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,9	96,3	97,7	98,4	96,7	93,6	98,8
	55-59 ans	96,5	97,7	95,3	100	100	97,2	94,3
	60-64 ans	97,2	97,4	97	97,8	92,6	97,3	97,6
	65-69 ans	96,7	96,3	97,1	95,5	100	96,4	96,8
	70-74 ans	92,8	91,6	93,8	83,3	85,7	92,6	94,1
	50-74 ans	96,1	96,1	96,2	97,2	96,6	95,7	96,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	2	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	55-59 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	60-64 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	65-69 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	50-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	99	101	95	99	95	104	96
	55-59 ans	86	87	85	97	102	84	82
	60-64 ans	91	100	83	131	96	93	81
	65-69 ans	90	80	100	99	82	77	102
	70-74 ans	82	85	79	54	192	89	74
	50-74 ans	90	91	88	101	99	88	86
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	54 (37-85)	54.5 (37-85)	53 (37-85)	52 (37-73)	56.5 (41-86.5)	58 (38-100)	50 (35-80)
	55-59 ans	51.5 (32.5-80)	52 (32-74)	50 (33-83)	58 (34-81)	64 (41-99)	51 (32-74)	49 (32-80)
	60-64 ans	52 (36-88)	54.5 (39-97)	51 (34-74)	56 (44-143)	48 (36-70)	53 (38-88)	51 (34-75)
	65-69 ans	52 (35-83)	52 (35-75)	52 (36-86)	51 (28-78)	64 (39.5-108.5)	52.5 (35.5-72.5)	50 (36-83)
	70-74 ans	55.5 (38-76)	57 (39-77)	54.5 (36-73.5)	41 (34-72)	153 (34-401)	59 (41-78.5)	54 (36-72)
	50-74 ans	53 (36-82)	53 (37-82)	52 (35-82)	54 (36-85)	56 (39-97)	53 (37-81)	51 (35-79)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,1	4,6	3,6	6,4	3,9	2	3,2
	55-59 ans	2	2,1	1,9	6,8	5,3	1	1,1
	60-64 ans	2,5	3,8	1,2	7,3	0	2,9	1,3
	65-69 ans	2,8	3,8	1,8	10,3	0	2,7	1,9
	70-74 ans	1,8	1,6	1,8	4,8	0	1,2	1,9
	50-74 ans	2,6	3,2	2	6,9	3,1	2	1,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,5	99,1	97,7	100	96,7	97,9	98,8
	55-59 ans	98,8	99,5	97,9	100	100	99,4	97,5
	60-64 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	99
	65-69 ans	98,7	98,4	99	100	100	98,2	98,9
	70-74 ans	98,3	97	99,5	100	100	96,6	99,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98,8	98,9	98,7	100	98,3	98,6	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,1	48,4	63,6	52	66,3	43,6	60,5
	55-59 ans	49,8	46	53,9	44,4	63,6	46,3	51,9
	60-64 ans	51,3	45	57,3	44,4	63	45,2	56,6
	65-69 ans	50,3	37,2	62,3	34,8	52,9	37,5	63,2
	70-74 ans	45,8	36,3	53,8	22,2	57,1	38	53,7
	50-74 ans	50,5	43,1	58,1	45,7	63,6	42,2	56,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,7	10,5	11	12	10,9	8,5	11,1
	55-59 ans	13,4	10,8	16,2	13,9	15,2	10,2	16,5
	60-64 ans	8,3	8,2	8,4	4,4	14,8	9,1	7,5
	65-69 ans	7,5	5,2	9,7	0	0	6	10,5
	70-74 ans	7,9	4,2	11,2	5,6	0	4	11,6
	50-74 ans	9,6	8	11,1	9,3	10,8	7,6	11,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,9	0	0,8	0	1,1	0
	55-59 ans	0,2	0,5	0	2,8	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0,2	0,8	0	0,1	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,8	18,7	9,8	18,4	9,8	19,1	9,9
	55-59 ans	14,4	14,6	14,1	8,3	12,1	15,8	14,6
	60-64 ans	13,8	16,5	11,3	13,3	7,4	17,2	11,8
	65-69 ans	15,8	17,8	14	21,7	5,9	17,3	14,7
	70-74 ans	17	20,2	14,2	16,7	0	20,7	14,7
	50-74 ans	15,1	17,4	12,7	16,2	9,1	17,8	13,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14	16,4	11	13,6	6,5	20,2	16
	55-59 ans	16,8	20,7	12,6	16,7	6,1	21,5	13,9
	60-64 ans	20,9	24,2	17,6	33,3	11,1	22	18,4
	65-69 ans	17,1	26,2	8,7	30,4	41,2	25,6	5,8
	70-74 ans	17	22	12,7	16,7	14,3	22,7	12,6
	50-74 ans	17,3	21,8	12,7	19,4	10,8	22,6	13,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	3,7	2,9	3,2	4,3	4,3	1,2
	55-59 ans	4,5	6,6	2,1	13,9	3	5,1	1,9
	60-64 ans	4	5,6	2,5	4,4	3,7	5,9	2,4
	65-69 ans	8,5	13,6	3,9	13	0	13,7	4,2
	70-74 ans	10,4	15,5	6,1	38,9	14,3	12,7	5,8
	50-74 ans	6	8,5	3,5	8,5	4	8,5	3,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,3	0,5	0	0	0	1,1	0
	55-59 ans	0,2	0,5	0	0	0	0,6	0
	60-64 ans	0,6	0,4	0,8	0	0	0,5	0,9
	65-69 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,1
	70-74 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,1
	50-74 ans	0,4	0,3	0,6	0	0	0,4	0,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,3	0,9	1,7	0	2,2	2,1	1,2
	55-59 ans	0,7	0,5	1	0	0	0,6	1,3
	60-64 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,4
	65-69 ans	0,3	0	0,5	0	0	0	0,5
	70-74 ans	1,4	1,8	1	0	14,3	2	0,5
	50-74 ans	0,8	0,6	1,1	0	1,7	0,8	1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	5,8	2,4	5,2	1,7	6,6	3,2
	55-59 ans	4,9	6,6	3,6	5	3	6,9	3,7
	60-64 ans	6,2	7,8	4,8	13,4	3,6	7	5
	65-69 ans	6,5	9,2	4,3	13,2	11,1	8,7	3,8
	70-74 ans	7,3	9,2	5,8	9,3	4,2	9,2	5,9
	50-74 ans	5,6	7,5	4	7	2,7	7,6	4,4
	50-74 ans **	5,6	7,4	4
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,7	1,2	2,2	0,7	3,4	2
	55-59 ans	2,7	3,8	1,7	3,3	1	3,9	1,8
	60-64 ans	3,7	4,7	2,9	9,5	2,2	3,9	3
	65-69 ans	3,4	5,5	1,6	7,7	9,7	5,2	1,1
	70-74 ans	3,6	4,8	2,7	4,7	2,1	4,8	2,7
	50-74 ans	3	4,2	2	3,8	1,4	4,3	2,1
	50-74 ans **	3	4,1	2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,8	1	1,4	0,5	2,3	1,7
	55-59 ans	2	2,7	1,3	2,8	1	2,7	1,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	2,6	3,6	1,9	7	2,2	3,1	1,8
		65-69 ans	2,4	3,8	1,2	7,7	8,4	3,4	0,7
		70-74 ans	2,6	3,4	2	3,1	2,1	3,4	2
		50-74 ans	2,1	3	1,5	2,9	1,2	3	1,5
		50-74 ans**	2,2	2,9	1,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	0,5	0,7	0,3	0,7	0,5	0,7	0,2
		55-59 ans	0,7	1,2	0,3	2,8	0,5	0,9	0,2
		60-64 ans	0,7	1,1	0,4	1,3	0,7	1,1	0,4
		65-69 ans	1,7	2,8	0,7	3,3	0	2,8	0,8
		70-74 ans	2,2	3,4	1,3	10,9	2,1	2,7	1,2
		50-74 ans	1	1,6	0,5	1,8	0,5	1,6	0,6
		50-74 ans**	1	1,6	0,5
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	3,3	4,3	0	0	0	5	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	0,9	1,3	0	0	0	1,7	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009