

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Tableau 2-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2010-2011 sur 99 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	20 999	11 246	9 753	8 590	7 075	2 656	2 678
	55-59 ans	21 728	11 627	10 101	5 871	4 500	5 756	5 601
	60-64 ans	26 010	13 751	12 259	6 079	4 864	7 672	7 395
	65-69 ans	19 085	9 940	9 145	3 670	3 123	6 270	6 022
	70-74 ans	18 527	9 515	9 012	3 241	2 812	6 274	6 200
	50-74 ans	106 349	56 079	50 270	27 451	22 374	28 628	27 896
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	21 236	11 361	9 875	8 686	7 166	2 675	2 709
	55-59 ans	22 013	11 769	10 244	5 962	4 587	5 807	5 657
	60-64 ans	26 343	13 906	12 437	6 165	4 946	7 741	7 491
	65-69 ans	19 443	10 120	9 323	3 757	3 203	6 363	6 120
	70-74 ans	18 943	9 705	9 238	3 324	2 905	6 381	6 333
	50-74 ans	107 978	56 861	51 117	27 894	22 807	28 967	28 310
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	11 612	5 362	6 250	4 097	4 500	1 265	1 750
	55-59 ans	10 988	4 890	6 098	2 396	2 648	2 494	3 450
	60-64 ans	12 222	5 113	7 109	2 140	2 683	2 973	4 426
	65-69 ans	8 660	3 508	5 152	1 245	1 682	2 263	3 470
	70-74 ans	8 207	3 321	4 886	1 048	1 486	2 273	3 400
	50-74 ans	51 689	22 194	29 495	10 926	12 999	11 268	16 496
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1 514	881	633	653	439	228	194
	55-59 ans	1 433	801	632	384	258	417	374
	60-64 ans	1 629	888	741	347	295	541	446
	65-69 ans	1 038	551	487	165	163	386	324
	70-74 ans	862	424	438	147	115	277	323
	50-74 ans	6 476	3 545	2 931	1 696	1 270	1 849	1 661
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	131	80	51	64	36	16	15
	55-59 ans	117	63	54	36	28	27	26
	60-64 ans	120	75	45	31	18	44	27
	65-69 ans	83	43	40	10	10	33	30
	70-74 ans	65	33	32	9	13	24	19
	50-74 ans	516	294	222	150	105	144	117
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	2 356	1 479	877	1 072	628	407	249

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Tableau 2-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2010-2011 sur 99 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2 835	1 775	1 060	848	489	927	571
	60-64 ans	3 604	2 203	1 401	904	560	1 299	841
	65-69 ans	2 672	1 569	1 103	553	375	1 016	728
	70-74 ans	2 575	1 485	1 090	472	315	1 013	775
	50-74 ans	14 042	8 511	5 531	3 849	2 367	4 662	3 164
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	3 161	2 118	1 043	1 655	782	463	261
	55-59 ans	3 686	2 521	1 165	1 359	542	1 162	623
	60-64 ans	4 913	3 256	1 657	1 553	725	1 703	932
	65-69 ans	3 834	2 543	1 291	953	473	1 590	818
	70-74 ans	3 879	2 450	1 429	824	458	1 626	971
	50-74 ans	19 473	12 888	6 585	6 344	2 980	6 544	3 605
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	791	472	319	379	262	93	57
	55-59 ans	1 231	746	485	438	260	308	225
	60-64 ans	1 821	1 198	623	643	297	555	326
	65-69 ans	1 644	1 057	587	489	240	568	347
	70-74 ans	1 911	1 223	688	530	267	693	421
	50-74 ans	7 398	4 696	2 702	2 479	1 326	2 217	1 376
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	189	102	87	79	64	23	23
	55-59 ans	165	90	75	40	34	50	41
	60-64 ans	185	100	85	41	34	59	51
	65-69 ans	139	70	69	22	27	48	42
	70-74 ans	124	67	57	26	16	41	41
	50-74 ans	802	429	373	208	175	221	198
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1 303	779	524	612	385	167	139
	55-59 ans	1 355	783	572	393	260	390	312
	60-64 ans	1 638	967	671	441	278	526	393
	65-69 ans	1 172	666	506	259	183	407	323
	70-74 ans	1 109	610	499	222	179	388	320
	50-74 ans	6 577	3 805	2 772	1 927	1 285	1 878	1 487
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	179	88	91	75	70	13	21
	55-59 ans	203	100	103	68	68	32	35

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Tableau 2-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2010-2011 sur 99 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	211	106	105	65	56	41	49
	65-69 ans	201	113	88	61	50	52	38
	70-74 ans	211	92	119	46	56	46	63
	50-74 ans	1 005	499	506	315	300	184	206
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	5 695	3 722	1 973	2 818	1 448	904	525
	55-59 ans	6 726	4 433	2 293	2 267	1 064	2 166	1 229
	60-64 ans	8 796	5 643	3 153	2 524	1 317	3 119	1 836
	65-69 ans	6 707	4 236	2 471	1 552	861	2 684	1 610
	70-74 ans	6 693	4 080	2 613	1 335	799	2 745	1 814
	50-74 ans	34 617	22 114	12 503	10 496	5 489	11 618	7 014
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	3 161	2 118	1 043	1 655	782	463	261
	55-59 ans	3 686	2 521	1 165	1 359	542	1 162	623
	60-64 ans	4 913	3 256	1 657	1 553	725	1 703	932
	65-69 ans	3 834	2 543	1 291	953	473	1 590	818
	70-74 ans	3 880	2 451	1 429	825	458	1 626	971
	50-74 ans	19 474	12 889	6 585	6 345	2 980	6 544	3 605
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	792	473	319	380	262	93	57
	55-59 ans	1 233	748	485	440	260	308	225
	60-64 ans	1 828	1 203	625	647	298	556	327
	65-69 ans	1 647	1 059	588	490	241	569	347
	70-74 ans	1 914	1 223	691	530	270	693	421
	50-74 ans	7 414	4 706	2 708	2 487	1 331	2 219	1 377

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Tableau 2-B: Indicateurs des lésions détectées pour la période 2010-2011 sur 99 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	99,2	99,0	99,1	99,0	99,6	99,1
	55-59 ans	99,0	99,1	98,9	98,7	98,4	99,5	99,4
	60-64 ans	99,2	99,3	99,0	99,0	98,7	99,5	99,3
	65-69 ans	98,9	98,8	98,9	98,3	98,4	99,2	99,1
	70-74 ans	98,8	99,0	98,5	98,5	97,8	99,3	98,9
	50-74 ans	99,0	99,1	98,9	98,8	98,6	99,4	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,7	47,2	63,3	47,2	62,8	47,3	64,6
	55-59 ans	49,9	41,5	59,5	40,2	57,7	42,9	61,0
	60-64 ans	46,4	36,8	57,2	34,7	54,2	38,4	59,1
	65-69 ans	44,5	34,7	55,3	33,1	52,5	35,6	56,7
	70-74 ans	43,3	34,2	52,9	31,5	51,2	35,6	53,7
	50-74 ans	47,9	39,0	57,7	39,2	57,0	38,9	58,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,1	7,8	6,4	7,5	6,1	8,5	7,2
	55-59 ans	6,5	6,8	6,2	6,4	5,6	7,2	6,6
	60-64 ans	6,2	6,4	6,0	5,6	6,0	7,0	6,0
	65-69 ans	5,3	5,4	5,2	4,4	5,1	6,1	5,3
	70-74 ans	4,6	4,4	4,7	4,4	4,0	4,3	5,1
	50-74 ans	6,0	6,2	5,7	6,1	5,6	6,4	5,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0,7	0,5	0,7	0,5	0,6	0,6
	55-59 ans	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5
	60-64 ans	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,6	0,4
	65-69 ans	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5
	70-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3
	50-74 ans	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,1	13,0	8,9	12,3	8,8	15,2	9,2
	55-59 ans	12,9	15,1	10,3	14,2	10,7	16,0	10,1
	60-64 ans	13,7	15,8	11,3	14,7	11,3	16,8	11,2
	65-69 ans	13,7	15,5	11,8	14,7	11,7	16,0	11,9
	70-74 ans	13,6	15,3	11,8	14,2	10,8	15,9	12,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Tableau 2-B: Indicateurs des lésions détectées pour la période 2010-2011 sur 99 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	13,0	15,0	10,8	13,8	10,4	16,1	11,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,9	18,6	10,6	19,1	10,9	17,3	9,6
	55-59 ans	16,7	21,4	11,4	22,8	11,8	20,0	11,0
	60-64 ans	18,7	23,4	13,3	25,2	14,7	22,0	12,4
	65-69 ans	19,7	25,1	13,8	25,4	14,8	25,0	13,4
	70-74 ans	20,5	25,2	15,5	24,8	15,8	25,5	15,3
	50-74 ans	18,0	22,7	12,9	22,7	13,1	22,6	12,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	4,2	3,2	4,4	3,7	3,5	2,1
	55-59 ans	5,6	6,3	4,7	7,3	5,7	5,3	4,0
	60-64 ans	6,9	8,6	5,0	10,4	6,0	7,2	4,4
	65-69 ans	8,5	10,4	6,3	13,0	7,5	8,9	5,7
	70-74 ans	10,1	12,6	7,4	15,9	9,2	10,9	6,6
	50-74 ans	6,9	8,3	5,3	8,9	5,8	7,7	4,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8
	55-59 ans	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,9	0,7
	60-64 ans	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7
	65-69 ans	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8	0,8	0,7
	70-74 ans	0,7	0,7	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6
	50-74 ans	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,1	6,9	5,3	7,0	5,4	6,2	5,1
	55-59 ans	6,2	6,7	5,6	6,6	5,7	6,7	5,5
	60-64 ans	6,2	7,0	5,4	7,2	5,6	6,8	5,2
	65-69 ans	6,0	6,6	5,4	6,9	5,7	6,4	5,3
	70-74 ans	5,9	6,3	5,4	6,7	6,2	6,1	5,1
	50-74 ans	6,1	6,7	5,4	6,9	5,6	6,5	5,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	0,5	0,8
	55-59 ans	0,9	0,8	1,0	1,1	1,5	0,6	0,6
	60-64 ans	0,8	0,8	0,8	1,1	1,1	0,5	0,7
	65-69 ans	1,0	1,1	0,9	1,6	1,6	0,8	0,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Tableau 2-B: Indicateurs des lésions détectées pour la période 2010-2011 sur 99 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1,1	0,9	1,3	1,4	1,9	0,7	1,0
	50-74 ans	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	0,6	0,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,0	7,1	3,2	7,2	3,2	7,1	3,1
	55-59 ans	6,4	9,5	3,9	10,3	4,2	8,8	3,7
	60-64 ans	7,7	11,0	5,0	12,0	5,6	10,3	4,6
	65-69 ans	8,6	12,1	5,8	12,9	6,4	11,6	5,5
	70-74 ans	9,5	13,1	6,7	13,9	6,9	12,7	6,5
	50-74 ans	7,2	10,2	4,7	10,1	4,6	10,3	4,8
	50-74 ans **	7,3	10,1	4,7
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,1	1,7	4,2	1,7	3,6	1,5
	55-59 ans	3,5	5,4	2,0	6,2	2,1	4,7	1,9
	60-64 ans	4,3	6,4	2,6	7,4	3,1	5,6	2,4
	65-69 ans	4,9	7,2	3,0	7,9	3,5	6,9	2,8
	70-74 ans	5,5	7,9	3,6	8,6	4,0	7,5	3,5
	50-74 ans	4,0	6,0	2,5	6,1	2,5	5,8	2,5
	50-74 ans **	4,1	5,9	2,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,9	0,5	1,0	0,6	0,7	0,3
	55-59 ans	1,2	1,6	0,8	2,0	1,0	1,2	0,7
	60-64 ans	1,6	2,3	1,0	3,1	1,3	1,8	0,8
	65-69 ans	2,1	3,0	1,4	4,1	1,8	2,5	1,2
	70-74 ans	2,7	3,9	1,8	5,5	2,3	3,2	1,5
	50-74 ans	1,5	2,2	1,0	2,4	1,1	2,0	0,9
	50-74 ans **	1,5	2,1	1,0

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)