

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

| Effectifs sur la période 2009-2010 | | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------|
| | | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 6646 | 2993 | 3653 | 2866 | 3537 | 127 | 116 | |
| | 55-59 ans | 6297 | 2819 | 3478 | 2645 | 3278 | 174 | 200 | |
| | 60-64 ans | 6885 | 3152 | 3733 | 2838 | 3377 | 314 | 356 | |
| | 65-69 ans | 4565 | 2164 | 2401 | 1938 | 2149 | 226 | 252 | |
| | 70-74 ans | 4108 | 1851 | 2257 | 1580 | 1965 | 271 | 292 | |
| | 50-74 ans | 28501 | 12979 | 15522 | 11867 | 14306 | 1112 | 1216 | |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 200 | 78 | 122 | 76 | 118 | 2 | 4 | |
| | 55-59 ans | 192 | 81 | 111 | 76 | 103 | 5 | 8 | |
| | 60-64 ans | 206 | 90 | 116 | 83 | 106 | 7 | 10 | |
| | 65-69 ans | 149 | 74 | 75 | 69 | 63 | 5 | 12 | |
| | 70-74 ans | 140 | 74 | 66 | 65 | 60 | 9 | 6 | |
| | 50-74 ans | 887 | 397 | 490 | 369 | 450 | 28 | 40 | |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 144 | 57 | 87 | 55 | 84 | 2 | 3 | |
| | 55-59 ans | 150 | 61 | 89 | 58 | 81 | 3 | 8 | |
| | 60-64 ans | 165 | 71 | 94 | 64 | 84 | 7 | 10 | |
| | 65-69 ans | 111 | 54 | 57 | 50 | 46 | 4 | 11 | |
| | 70-74 ans | 107 | 57 | 50 | 49 | 44 | 8 | 6 | |
| | 50-74 ans | 677 | 300 | 377 | 276 | 339 | 24 | 38 | |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 56 | 21 | 35 | 21 | 34 | 0 | 1 | |
| | 55-59 ans | 42 | 20 | 22 | 18 | 22 | 2 | 0 | |
| | 60-64 ans | 41 | 19 | 22 | 19 | 22 | 0 | 0 | |
| | 65-69 ans | 38 | 20 | 18 | 19 | 17 | 1 | 1 | |
| | 70-74 ans | 33 | 17 | 16 | 16 | 16 | 1 | 0 | |
| | 50-74 ans | 210 | 97 | 113 | 93 | 111 | 4 | 2 | |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 6590 | 2972 | 3618 | 2845 | 3503 | 127 | 115 | |
| | 55-59 ans | 6255 | 2799 | 3456 | 2627 | 3256 | 172 | 200 | |
| | 60-64 ans | 6844 | 3133 | 3711 | 2819 | 3355 | 314 | 356 | |
| | 65-69 ans | 4527 | 2144 | 2383 | 1919 | 2132 | 225 | 251 | |
| | 70-74 ans | 4075 | 1834 | 2241 | 1564 | 1949 | 270 | 292 | |
| | 50-74 ans | 28291 | 12882 | 15409 | 11774 | 14195 | 1108 | 1214 | |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 178 | 99 | 79 | 95 | 75 | 4 | 4 | |
| | 55-59 ans | 165 | 101 | 64 | 95 | 59 | 6 | 5 | |
| | 60-64 ans | 250 | 139 | 111 | 122 | 83 | 17 | 28 | |
| | 65-69 ans | 144 | 76 | 68 | 69 | 61 | 7 | 7 | |
| | 70-74 ans | 161 | 88 | 73 | 72 | 58 | 16 | 15 | |
| | 50-74 ans | 898 | 503 | 395 | 453 | 336 | 50 | 59 | |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 175 | 98 | 77 | 94 | 73 | 4 | 4 | |
| | 55-59 ans | 164 | 101 | 63 | 95 | 58 | 6 | 5 | |
| | 60-64 ans | 244 | 135 | 109 | 118 | 82 | 17 | 27 | |
| | 65-69 ans | 143 | 76 | 67 | 69 | 60 | 7 | 7 | |
| | 70-74 ans | 154 | 84 | 70 | 69 | 55 | 15 | 15 | |
| | 50-74 ans | 880 | 494 | 386 | 445 | 328 | 49 | 58 | |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 153 | 86 | 67 | 83 | 63 | 3 | 4 | |
| | 55-59 ans | 134 | 78 | 56 | 72 | 52 | 6 | 4 | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 60-64 ans | 196 | 110 | 86 | 93 | 62 | 17 | 24 |
| | 65-69 ans | 119 | 65 | 54 | 59 | 48 | 6 | 6 |
| | 70-74 ans | 118 | 62 | 56 | 49 | 43 | 13 | 13 |
| | 50-74 ans | 720 | 401 | 319 | 356 | 268 | 45 | 51 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 123 | 67 | 56 | 64 | 52 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 108 | 63 | 45 | 57 | 41 | 6 | 4 |
| | 60-64 ans | 159 | 90 | 69 | 74 | 47 | 16 | 22 |
| | 65-69 ans | 97 | 54 | 43 | 50 | 38 | 4 | 5 |
| | 70-74 ans | 88 | 46 | 42 | 37 | 31 | 9 | 11 |
| | 50-74 ans | 575 | 320 | 255 | 282 | 209 | 38 | 46 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 153 | 86 | 67 | 83 | 63 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 134 | 78 | 56 | 72 | 52 | 6 | 4 |
| | 60-64 ans | 194 | 109 | 85 | 92 | 61 | 17 | 24 |
| | 65-69 ans | 119 | 65 | 54 | 59 | 48 | 6 | 6 |
| | 70-74 ans | 116 | 60 | 56 | 49 | 43 | 11 | 13 |
| | 50-74 ans | 716 | 398 | 318 | 355 | 267 | 43 | 51 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 152 | 86 | 66 | 83 | 62 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 132 | 76 | 56 | 70 | 52 | 6 | 4 |
| | 60-64 ans | 196 | 110 | 86 | 93 | 62 | 17 | 24 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 65-69 ans | 118 | 65 | 53 | 59 | 48 | 6 | 5 |
| | 70-74 ans | 115 | 60 | 55 | 48 | 42 | 12 | 13 |
| | 50-74 ans | 713 | 397 | 316 | 353 | 266 | 44 | 50 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 154 | 87 | 67 | 84 | 63 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 135 | 78 | 57 | 72 | 53 | 6 | 4 |
| | 60-64 ans | 198 | 112 | 86 | 95 | 62 | 17 | 24 |
| | 65-69 ans | 120 | 65 | 55 | 59 | 49 | 6 | 6 |
| | 70-74 ans | 121 | 64 | 57 | 50 | 44 | 14 | 13 |
| | 50-74 ans | 728 | 406 | 322 | 360 | 271 | 46 | 51 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 90 | 46 | 44 | 44 | 40 | 2 | 4 |
| | 55-59 ans | 63 | 34 | 29 | 31 | 27 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 84 | 45 | 39 | 39 | 28 | 6 | 11 |
| | 65-69 ans | 54 | 24 | 30 | 22 | 26 | 2 | 4 |
| | 70-74 ans | 62 | 29 | 33 | 20 | 26 | 9 | 7 |
| | 50-74 ans | 353 | 178 | 175 | 156 | 147 | 22 | 28 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 16 | 6 | 10 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| | 65-69 ans | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 45 | 24 | 21 | 20 | 17 | 4 | 4 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 30 | 14 | 16 | 13 | 15 | 1 | 1 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 15 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 29 | 18 | 11 | 13 | 7 | 5 | 4 |
| | 65-69 ans | 11 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 17 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| | 50-74 ans | 87 | 55 | 32 | 45 | 24 | 10 | 8 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 19 | 14 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 28 | 19 | 9 | 18 | 8 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 46 | 31 | 15 | 28 | 12 | 3 | 3 |
| | 65-69 ans | 27 | 21 | 6 | 20 | 6 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 24 | 16 | 8 | 15 | 6 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 144 | 101 | 43 | 95 | 37 | 6 | 6 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

| | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 43 | 22 | 21 | 22 | 19 | 0 | 2 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 15 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 34 | 24 | 10 | 24 | 10 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 43 | 29 | 14 | 26 | 13 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 75 | 49 | 26 | 41 | 19 | 8 | 7 |
| | 65-69 ans | 38 | 29 | 9 | 27 | 8 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 41 | 25 | 16 | 22 | 11 | 3 | 5 |
| | 50-74 ans | 231 | 156 | 75 | 140 | 61 | 16 | 14 |
| A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté | 50-54 ans | 19 | 14 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 28 | 19 | 9 | 18 | 8 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 46 | 31 | 15 | 28 | 12 | 3 | 3 |
| | 65-69 ans | 27 | 21 | 6 | 20 | 6 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 24 | 16 | 8 | 15 | 6 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 144 | 101 | 43 | 95 | 37 | 6 | 6 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 43 | 22 | 21 | 22 | 19 | 0 | 2 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 43 | 22 | 21 | 22 | 19 | 0 | 2 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 21 | 13 | 8 | 13 | 7 | 0 | 1 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 22 | 9 | 13 | 9 | 12 | 0 | 1 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | | | | | | | |
| | 55-59 ans | | | | | | | |
| | 60-64 ans | | | | | | | |
| | 65-69 ans | | | | | | | |
| | 70-74 ans | | | | | | | |
| | 50-74 ans | | | | | | | |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | | | | | | | |
| | 55-59 ans | | | | | | | |
| | 60-64 ans | | | | | | | |
| | 65-69 ans | | | | | | | |
| | 70-74 ans | | | | | | | |
| | 50-74 ans | | | | | | | |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | | | | | | | |
| | 55-59 ans | | | | | | | |
| | 60-64 ans | | | | | | | |
| | 65-69 ans | | | | | | | |
| | 70-74 ans | | | | | | | |
| | 50-74 ans | | | | | | | |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | | | | | | | |
| | 55-59 ans | | | | | | | |
| | 60-64 ans | | | | | | | |
| | 65-69 ans | | | | | | | |
| | 70-74 ans | | | | | | | |
| | 50-74 ans | | | | | | | |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | | | | | | | |
| | 55-59 ans | | | | | | | |
| | 60-64 ans | | | | | | | |
| | 65-69 ans | | | | | | | |
| | 70-74 ans | | | | | | | |

Données non disponibles

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-74 ans | | | | | | | |
| | 50-54 ans | | | | | | | |
| | 55-59 ans | | | | | | | |
| | 60-64 ans | | | | | | | |
| | 65-69 ans | | | | | | | |
| | 70-74 ans | | | | | | | |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-74 ans | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| A40- Perdus de vue | 50-74 ans | 29 | 13 | 16 | 13 | 15 | 0 | 1 |
| | 50-54 ans | 15 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 18 | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 29 | 13 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 16 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 16 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 94 | 52 | 42 | 52 | 42 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

| Indicateurs sur la période 2009-2010 | | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------|
| | | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 3 | 2,6 | 3,3 | 2,7 | 3,3 | 1,6 | 3,4 | |
| | 55-59 ans | 3 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 4 | |
| | 60-64 ans | 3 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 2,8 | |
| | 65-69 ans | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3,6 | 2,9 | 2,2 | 4,8 | |
| | 70-74 ans | 3,4 | 4 | 2,9 | 4,1 | 3,1 | 3,3 | 2,1 | |
| | 50-74 ans | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 3,3 | |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 0,8 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0 | 0,9 | |
| | 55-59 ans | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | |
| | 65-69 ans | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 1 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | |
| | 70-74 ans | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 1 | 0,8 | 0,4 | 0 | |
| | 50-74 ans | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 72 | 73,1 | 71,3 | 72,4 | 71,2 | 100 | 75 | |
| | 55-59 ans | 78,1 | 75,3 | 80,2 | 76,3 | 78,6 | 60 | 100 | |
| | 60-64 ans | 80,1 | 78,9 | 81 | 77,1 | 79,2 | 100 | 100 | |
| | 65-69 ans | 74,5 | 73 | 76 | 72,5 | 73 | 80 | 91,7 | |
| | 70-74 ans | 76,4 | 77 | 75,8 | 75,4 | 73,3 | 88,9 | 100 | |
| | 50-74 ans | 76,3 | 75,6 | 76,9 | 74,8 | 75,3 | 85,7 | 95 | |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,7 | 3,3 | 2,2 | 3,3 | 2,1 | 3,1 | 3,5 | |
| | 55-59 ans | 2,6 | 3,6 | 1,9 | 3,6 | 1,8 | 3,5 | 2,5 | |
| | 60-64 ans | 3,7 | 4,4 | 3 | 4,3 | 2,5 | 5,4 | 7,9 | |
| | 65-69 ans | 3,2 | 3,5 | 2,9 | 3,6 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | |
| | 70-74 ans | 4 | 4,8 | 3,3 | 4,6 | 3 | 5,9 | 5,1 | |
| | 50-74 ans | 3,2 | 3,9 | 2,6 | 3,8 | 2,4 | 4,5 | 4,9 | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 98,3 | 99 | 97,5 | 98,9 | 97,3 | 100 | 100 | |
| | 55-59 ans | 99,4 | 100 | 98,4 | 100 | 98,3 | 100 | 100 | |
| | 60-64 ans | 97,6 | 97,1 | 98,2 | 96,7 | 98,8 | 100 | 96,4 | |
| | 65-69 ans | 99,3 | 100 | 98,5 | 100 | 98,4 | 100 | 100 | |
| | 70-74 ans | 95,7 | 95,5 | 95,9 | 95,8 | 94,8 | 93,8 | 100 | |
| | 50-74 ans | 98 | 98,2 | 97,7 | 98,2 | 97,6 | 98 | 98,3 | |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 87,4 | 87,8 | 87 | 88,3 | 86,3 | 75 | 100 | |
| | 55-59 ans | 81,7 | 77,2 | 88,9 | 75,8 | 89,7 | 100 | 80 | |
| | 60-64 ans | 80,3 | 81,5 | 78,9 | 78,8 | 75,6 | 100 | 88,9 | |
| | 65-69 ans | 83,2 | 85,5 | 80,6 | 85,5 | 80 | 85,7 | 85,7 | |
| | 70-74 ans | 76,6 | 73,8 | 80 | 71 | 78,2 | 86,7 | 86,7 | |
| | 50-74 ans | 81,8 | 81,2 | 82,6 | 80 | 81,7 | 91,8 | 87,9 | |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 80,4 | 77,9 | 83,6 | 77,1 | 82,5 | 100 | 100 | |
| | 55-59 ans | 80,6 | 80,8 | 80,4 | 79,2 | 78,8 | 100 | 100 | |
| | 60-64 ans | 81,1 | 81,8 | 80,2 | 79,6 | 75,8 | 94,1 | 91,7 | |
| | 65-69 ans | 81,5 | 83,1 | 79,6 | 84,7 | 79,2 | 66,7 | 83,3 | |
| | 70-74 ans | 74,6 | 74,2 | 75 | 75,5 | 72,1 | 69,2 | 84,6 | |
| | 50-74 ans | 79,9 | 79,8 | 79,9 | 79,2 | 78 | 84,4 | 90,2 | |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 102 | 109 | 93 | 110 | 94 | 91 | 85 | |
| | 55-59 ans | 115 | 115 | 114 | 120 | 113 | 66 | 127 | |
| | 60-64 ans | 107 | 117 | 95 | 123 | 101 | 82 | 79 | |
| | 65-69 ans | 99 | 104 | 91 | 106 | 90 | 88 | 106 | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 70-74 ans | 100 | 106 | 93 | 104 | 96 | 117 | 82 |
| | 50-74 ans | 105 | 111 | 97 | 113 | 99 | 91 | 87 |
| C03- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 8,4 | 8,1 | 8,9 | 8,4 | 9,3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 10,9 | 12,9 | 7,8 | 13,7 | 8,5 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 11,6 | 9,4 | 14,4 | 10,7 | 19,3 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 11,1 | 7,9 | 14,7 | 8,7 | 16,4 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 9,9 | 13,6 | 5,5 | 16,7 | 6,9 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 10,5 | 10,3 | 10,6 | 11,5 | 12,5 | 0 | 0 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 99,3 | 100 | 98,5 | 100 | 98,4 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 98,5 | 97,4 | 100 | 97,2 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 99,2 | 100 | 98,1 | 100 | 100 | 100 | 83,3 |
| | 70-74 ans | 97,5 | 96,8 | 98,2 | 98 | 97,7 | 92,3 | 100 |
| | 50-74 ans | 99 | 99 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 97,8 | 98 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 58,4 | 52,9 | 65,7 | 52,4 | 63,5 | 66,7 | 100 |
| | 55-59 ans | 46,7 | 43,6 | 50,9 | 43,1 | 50,9 | 50 | 50 |
| | 60-64 ans | 42,4 | 40,2 | 45,3 | 41,1 | 45,2 | 35,3 | 45,8 |
| | 65-69 ans | 45 | 36,9 | 54,5 | 37,3 | 53,1 | 33,3 | 66,7 |
| | 70-74 ans | 51,2 | 45,3 | 57,9 | 40 | 59,1 | 64,3 | 53,8 |
| | 50-74 ans | 48,5 | 43,8 | 54,3 | 43,3 | 54,2 | 47,8 | 54,9 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 7,1 | 9,2 | 4,5 | 9,5 | 4,8 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5,2 | 3,8 | 7 | 4,2 | 7,5 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 8,1 | 5,4 | 11,6 | 3,2 | 9,7 | 17,6 | 16,7 |
| | 65-69 ans | 7,5 | 9,2 | 5,5 | 10,2 | 6,1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 0 | 2,3 | 7,1 | 0 |
| | 50-74 ans | 6,2 | 5,9 | 6,5 | 5,6 | 6,3 | 8,7 | 7,8 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 3,2 | 3,4 | 3 | 3,6 | 3,2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 7,4 | 5,1 | 10,5 | 5,6 | 9,4 | 0 | 25 |
| | 60-64 ans | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 5,3 | 6,5 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 5 | 3,1 | 7,3 | 1,7 | 8,2 | 16,7 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4,1 | 3,4 | 5 | 3,6 | 5,5 | 2,2 | 2 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 9,7 | 11,5 | 7,5 | 11,9 | 7,9 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 11,1 | 12,8 | 8,8 | 11,1 | 9,4 | 33,3 | 0 |
| | 60-64 ans | 14,6 | 16,1 | 12,8 | 13,7 | 11,3 | 29,4 | 16,7 |
| | 65-69 ans | 9,2 | 12,3 | 5,5 | 11,9 | 4,1 | 16,7 | 16,7 |
| | 70-74 ans | 14 | 14,1 | 14 | 14 | 11,4 | 14,3 | 23,1 |
| | 50-74 ans | 12 | 13,5 | 9,9 | 12,5 | 8,9 | 21,7 | 15,7 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 12,3 | 16,1 | 7,5 | 16,7 | 7,9 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 20,7 | 24,4 | 15,8 | 25 | 15,1 | 16,7 | 25 |
| | 60-64 ans | 23,2 | 27,7 | 17,4 | 29,5 | 19,4 | 17,6 | 12,5 |
| | 65-69 ans | 22,5 | 32,3 | 10,9 | 33,9 | 12,2 | 16,7 | 0 |
| | 70-74 ans | 19,8 | 25 | 14 | 30 | 13,6 | 7,1 | 15,4 |
| | 50-74 ans | 19,8 | 24,9 | 13,4 | 26,4 | 13,7 | 13 | 11,8 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 3,9 | 3,4 | 4,5 | 3,6 | 4,8 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5,2 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,7 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 5,6 | 6,3 | 4,7 | 7,4 | 4,8 | 0 | 4,2 |
| | 65-69 ans | 7,5 | 3,1 | 12,7 | 3,4 | 14,3 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 8,3 | 9,4 | 7 | 12 | 6,8 | 0 | 7,7 |
| | 50-74 ans | 5,9 | 5,4 | 6,5 | 6,1 | 7 | 0 | 3,9 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 3,2 | 1,1 | 6 | 0 | 6,3 | 33,3 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 2,8 | 1,9 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 2,3 | 0 | 1,6 | 0 | 4,2 |
| | 65-69 ans | 2,5 | 3,1 | 1,8 | 1,7 | 2 | 16,7 | 0 |
| | 70-74 ans | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2,1 | 1,5 | 2,8 | 1,1 | 3 | 4,3 | 2 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 1,9 | 2,3 | 1,5 | 2,4 | 1,6 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,5 | 2,6 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,5 | 0 | 1,2 | 0 | 1,6 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,8 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 16,7 |
| | 70-74 ans | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 2 | 4,5 | 7,1 | 0 |
| | 50-74 ans | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 2,2 | 2 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 5,2 | 8,1 | 2,8 | 8,4 | 2,9 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6,9 | 10,4 | 4,1 | 9,9 | 4 | 17,4 | 5 |
| | 60-64 ans | 11 | 15,6 | 7 | 14,5 | 5,7 | 25,5 | 19,7 |
| | 65-69 ans | 8,4 | 13,5 | 3,8 | 14,1 | 3,8 | 8,9 | 4 |
| | 70-74 ans | 10,1 | 13,6 | 7,1 | 14,1 | 5,6 | 11,1 | 17,1 |
| | 50-74 ans | 8,2 | 12,1 | 4,9 | 11,9 | 4,3 | 14,4 | 11,5 |
| | 50-74 ans ** | 8,2 | 11,8 | 4,8 | . | . | . | . |
| D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,9 | 4,7 | 1,4 | 4,9 | 1,4 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4,5 | 6,8 | 2,6 | 6,9 | 2,5 | 5,8 | 5 |
| | 60-64 ans | 6,7 | 9,9 | 4 | 9,9 | 3,6 | 9,6 | 8,4 |
| | 65-69 ans | 6 | 9,8 | 2,5 | 10,4 | 2,8 | 4,4 | 0 |
| | 70-74 ans | 5,9 | 8,7 | 3,6 | 9,6 | 3,1 | 3,7 | 6,8 |
| | 50-74 ans | 5,1 | 7,8 | 2,8 | 8,1 | 2,6 | 5,4 | 4,9 |
| | 50-74 ans ** | 5,1 | 7,6 | 2,7 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,9 | 1 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,6 | 2,2 | 1,1 | 2,5 | 0,9 | 0 | 2,8 |
| | 65-69 ans | 2 | 0,9 | 2,9 | 1 | 3,3 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2,5 | 3,3 | 1,8 | 3,8 | 1,5 | 0 | 3,4 |
| | 50-74 ans | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 1,3 | 0 | 1,6 |
| | 50-74 ans ** | 1,5 | 1,7 | 1,4 | . | . | . | . |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 83,3 | 100 | 66,7 | 100 | 66,7 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 14,3 | 0 | 33,3 | 0 | 33,3 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 54,5 | 57,1 | 50 | 57,1 | 33,3 | 0 | 100 |
| | 65-69 ans | 22,2 | 50 | 14,3 | 50 | 14,3 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 70 | 83,3 | 50 | 83,3 | 66,7 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 48,8 | 59,1 | 38,1 | 59,1 | 36,8 | 0 | 50 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des