

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9870	4326	5544	3988	5070	338	474
	55-59 ans	9864	4183	5681	3748	5094	435	587
	60-64 ans	11772	5049	6723	4501	6044	548	679
	65-69 ans	9187	4127	5060	3689	4560	438	500
	70-74 ans	8244	3693	4551	3317	4097	376	454
	<b>50-74 ans</b>	<b>48937</b>	<b>21378</b>	<b>27559</b>	<b>19243</b>	<b>24865</b>	<b>2135</b>	<b>2694</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	868	420	448	401	430	19	18
	55-59 ans	940	434	506	415	482	19	24
	60-64 ans	1079	486	593	460	548	26	45
	65-69 ans	933	406	527	378	490	28	37
	70-74 ans	910	403	507	382	480	21	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>4730</b>	<b>2149</b>	<b>2581</b>	<b>2036</b>	<b>2430</b>	<b>113</b>	<b>151</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	603	288	315	273	302	15	13
	55-59 ans	675	310	365	294	350	16	15
	60-64 ans	788	343	445	322	409	21	36
	65-69 ans	714	302	412	284	390	18	22
	70-74 ans	689	299	390	280	368	19	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>3469</b>	<b>1542</b>	<b>1927</b>	<b>1453</b>	<b>1819</b>	<b>89</b>	<b>108</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	265	132	133	128	128	4	5
	55-59 ans	265	124	141	121	132	3	9
	60-64 ans	291	143	148	138	139	5	9
	65-69 ans	219	104	115	94	100	10	15
	70-74 ans	221	104	117	102	112	2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1261</b>	<b>607</b>	<b>654</b>	<b>583</b>	<b>611</b>	<b>24</b>	<b>43</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9605	4194	5411	3860	4942	334	469
	55-59 ans	9599	4059	5540	3627	4962	432	578
	60-64 ans	11481	4906	6575	4363	5905	543	670
	65-69 ans	8968	4023	4945	3595	4460	428	485
	70-74 ans	8023	3589	4434	3215	3985	374	449
	<b>50-74 ans</b>	<b>47676</b>	<b>20771</b>	<b>26905</b>	<b>18660</b>	<b>24254</b>	<b>2111</b>	<b>2651</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	196	109	87	104	83	5	4
	55-59 ans	215	126	89	118	82	8	7
	60-64 ans	310	163	147	148	132	15	15
	65-69 ans	270	150	120	136	109	14	11
	70-74 ans	266	142	124	138	115	4	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1257</b>	<b>690</b>	<b>567</b>	<b>644</b>	<b>521</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	196	109	87	104	83	5	4
	55-59 ans	214	125	89	117	82	8	7
	60-64 ans	309	162	147	147	132	15	15
	65-69 ans	265	148	117	134	107	14	10
	70-74 ans	260	137	123	133	114	4	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1244</b>	<b>681</b>	<b>563</b>	<b>635</b>	<b>518</b>	<b>46</b>	<b>45</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	154	82	72	77	70	5	2
	55-59 ans	183	106	77	100	71	6	6
	60-64 ans	269	139	130	127	117	12	13
	65-69 ans	226	128	98	116	91	12	7
	70-74 ans	226	119	107	115	100	4	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1058</b>	<b>574</b>	<b>484</b>	<b>535</b>	<b>449</b>	<b>39</b>	<b>35</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	117	66	51	63	50	3	1
	55-59 ans	142	86	56	81	50	5	6
	60-64 ans	222	109	113	98	105	11	8
	65-69 ans	167	93	74	83	70	10	4
	70-74 ans	167	88	79	85	72	3	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>815</b>	<b>442</b>	<b>373</b>	<b>410</b>	<b>347</b>	<b>32</b>	<b>26</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	153	82	71	77	69	5	2
	55-59 ans	180	106	74	100	68	6	6
	60-64 ans	266	137	129	125	116	12	13
	65-69 ans	225	128	97	116	90	12	7
	70-74 ans	220	118	102	114	95	4	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1044</b>	<b>571</b>	<b>473</b>	<b>532</b>	<b>438</b>	<b>39</b>	<b>35</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	3	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	6	1	5	1	5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	132	72	60	68	59	4	1
	55-59 ans	166	97	69	91	63	6	6
	60-64 ans	248	127	121	115	111	12	10
	65-69 ans	196	107	89	97	82	10	7
	70-74 ans	197	103	94	100	87	3	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>939</b>	<b>506</b>	<b>433</b>	<b>471</b>	<b>402</b>	<b>35</b>	<b>31</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	154	82	72	77	70	5	2
	55-59 ans	183	106	77	100	71	6	6
	60-64 ans	269	139	130	127	117	12	13
	65-69 ans	227	129	98	117	91	12	7
	70-74 ans	226	119	107	115	100	4	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1059</b>	<b>575</b>	<b>484</b>	<b>536</b>	<b>449</b>	<b>39</b>	<b>35</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	60	30	30	28	30	2	0
	55-59 ans	79	38	41	33	39	5	2
	60-64 ans	107	41	66	37	60	4	6
	65-69 ans	73	32	41	27	39	5	2
	70-74 ans	92	36	56	36	53	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>411</b>	<b>177</b>	<b>234</b>	<b>161</b>	<b>221</b>	<b>16</b>	<b>13</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	7	6	1	5	1	1	0
	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0
	60-64 ans	4	4	0	4	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	6	3	3	3	2	0	1
	70-74 ans	6	4	2	4	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	7	4	3	3	2	1	1
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	10	4	6	4	6	0	0
	70-74 ans	6	4	2	4	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	6	1	6	1	0	0
	55-59 ans	8	6	2	6	2	0	0
	60-64 ans	22	15	7	13	6	2	1
	65-69 ans	17	10	7	9	6	1	1
	70-74 ans	9	5	4	5	4	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19	13	6	13	6	0	0
	55-59 ans	12	8	4	8	4	0	0
	60-64 ans	35	21	14	20	14	1	0
	65-69 ans	17	14	3	11	2	3	1
	70-74 ans	20	12	8	11	7	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>103</b>	<b>68</b>	<b>35</b>	<b>63</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	2	0	0
	60-64 ans	9	7	2	6	2	1	0
	65-69 ans	14	8	6	7	5	1	1
	70-74 ans	11	6	5	6	4	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	34	15	19	14	18	1	1
	55-59 ans	51	33	18	33	15	0	3
	60-64 ans	65	36	29	32	27	4	2
	65-69 ans	67	42	25	42	24	0	1
	70-74 ans	55	38	17	36	16	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>272</b>	<b>164</b>	<b>108</b>	<b>157</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	22	9	13	8	12	1	1
	55-59 ans	15	9	6	9	6	0	0
	60-64 ans	24	14	10	14	7	0	3
	65-69 ans	23	16	7	14	7	2	0
	70-74 ans	26	13	13	12	13	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>61</b>	<b>49</b>	<b>57</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	26	19	7	19	7	0	0
	55-59 ans	20	14	6	14	6	0	0
	60-64 ans	57	36	21	33	20	3	1
	65-69 ans	34	24	10	20	8	4	2
	70-74 ans	29	17	12	16	11	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>166</b>	<b>110</b>	<b>56</b>	<b>102</b>	<b>52</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	19	13	6	13	6	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	12	8	4	8	4	0	0
	60-64 ans	35	21	14	20	14	1	0
	65-69 ans	17	14	3	11	2	3	1
	70-74 ans	20	12	8	11	7	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>103</b>	<b>68</b>	<b>35</b>	<b>63</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	2	0	0
	60-64 ans	9	7	2	6	2	1	0
	65-69 ans	14	8	6	7	5	1	1
	70-74 ans	11	6	5	6	4	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	2	0	0
	60-64 ans	9	7	2	6	2	1	0
	65-69 ans	14	8	6	7	5	1	1
	70-74 ans	11	6	5	6	4	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	2	0	0
	60-64 ans	9	7	2	6	2	1	0
	65-69 ans	14	8	6	7	5	1	1
	70-74 ans	11	6	5	6	4	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	24	16	8	16	7	0	1	1
	55-59 ans	11	4	7	4	7	0	0	0
	60-64 ans	23	16	7	15	7	1	0	0
	65-69 ans	19	13	6	13	6	0	0	0
	70-74 ans	16	8	8	8	8	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>57</b>	<b>36</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,8	9,7	8,1	10,1	8,5	5,6	3,8	
	55-59 ans	9,5	10,4	8,9	11,1	9,5	4,4	4,1	
	60-64 ans	9,2	9,6	8,8	10,2	9,1	4,7	6,6	
	65-69 ans	10,2	9,8	10,4	10,2	10,7	6,4	7,4	
	70-74 ans	11	10,9	11,1	11,5	11,7	5,6	5,9	
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,7</b>	<b>10,1</b>	<b>9,4</b>	<b>10,6</b>	<b>9,8</b>	<b>5,3</b>	<b>5,6</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,7	3,1	2,4	3,2	2,5	1,2	1,1	
	55-59 ans	2,7	3	2,5	3,2	2,6	0,7	1,5	
	60-64 ans	2,5	2,8	2,2	3,1	2,3	0,9	1,3	
	65-69 ans	2,4	2,5	2,3	2,5	2,2	2,3	3	
	70-74 ans	2,7	2,8	2,6	3,1	2,7	0,5	1,1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>3</b>	<b>2,5</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,5	68,6	70,3	68,1	70,2	78,9	72,2	
	55-59 ans	71,8	71,4	72,1	70,8	72,6	84,2	62,5	
	60-64 ans	73	70,6	75	70	74,6	80,8	80	
	65-69 ans	76,5	74,4	78,2	75,1	79,6	64,3	59,5	
	70-74 ans	75,7	74,2	76,9	73,3	76,7	90,5	81,5	
	<b>50-74 ans</b>	<b>73,3</b>	<b>71,8</b>	<b>74,7</b>	<b>71,4</b>	<b>74,9</b>	<b>78,8</b>	<b>71,5</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,6	1,6	2,7	1,7	1,5	0,9	
	55-59 ans	2,2	3,1	1,6	3,3	1,7	1,9	1,2	
	60-64 ans	2,7	3,3	2,2	3,4	2,2	2,8	2,2	
	65-69 ans	3	3,7	2,4	3,8	2,4	3,3	2,3	
	70-74 ans	3,3	4	2,8	4,3	2,9	1,1	2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>	<b>3,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	99,5	99,2	100	99,2	100	100	100	
	60-64 ans	99,7	99,4	100	99,3	100	100	100	
	65-69 ans	98,1	98,7	97,5	98,5	98,2	100	90,9	
	70-74 ans	97,7	96,5	99,2	96,4	99,1	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>98,7</b>	<b>99,3</b>	<b>98,6</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	<b>97,8</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	78,6	75,2	82,8	74	84,3	100	50	
	55-59 ans	85,5	84,8	86,5	85,5	86,6	75	85,7	
	60-64 ans	87,1	85,8	88,4	86,4	88,6	80	86,7	
	65-69 ans	85,3	86,5	83,8	86,6	85	85,7	70	
	70-74 ans	86,9	86,9	87	86,5	87,7	100	77,8	
	<b>50-74 ans</b>	<b>85</b>	<b>84,3</b>	<b>86</b>	<b>84,3</b>	<b>86,7</b>	<b>84,8</b>	<b>77,8</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	76	80,5	70,8	81,8	71,4	60	50	
	55-59 ans	77,6	81,1	72,7	81	70,4	83,3	100	
	60-64 ans	82,5	78,4	86,9	77,2	89,7	91,7	61,5	
	65-69 ans	73,9	72,7	75,5	71,6	76,9	83,3	57,1	
	70-74 ans	73,9	73,9	73,8	73,9	72	75	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77,1</b>	<b>76,6</b>	<b>77,3</b>	<b>82,1</b>	<b>74,3</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	2	1	2	2	1	1	
	55-59 ans	1	2	1	2	1	1	1	
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	65-69 ans	1	1	1	2	1	1	1	
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1	
<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63	61	65	62	66	42	52	
	55-59 ans	56	60	52	61	53	44	35	
	60-64 ans	61	60	62	57	65	95	40	
	65-69 ans	52	54	50	54	51	50	41	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	60	70	48	71	48	39	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>61</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>42</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,2	14,7	9,2	15,4	8,4	0	25
	55-59 ans	5,1	3,2	7,9	3,4	8,5	0	0
	60-64 ans	7,4	9,8	4,8	10,1	5,3	6,7	0
	65-69 ans	7	8,7	5	9,6	5,5	0	0
	70-74 ans	6	5,6	6,5	5,8	7	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,4</b>	<b>8,3</b>	<b>6,3</b>	<b>8,7</b>	<b>6,7</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	85,7	87,8	83,3	88,3	84,3	80	50
	55-59 ans	90,7	91,5	89,6	91	88,7	100	100
	60-64 ans	92,2	91,4	93,1	90,6	94,9	100	76,9
	65-69 ans	86,7	83,6	90,8	83,6	90,1	83,3	100
	70-74 ans	87,2	86,6	87,9	87	87	75	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,8</b>	<b>88,2</b>	<b>89,5</b>	<b>88</b>	<b>89,5</b>	<b>89,7</b>	<b>88,6</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39	36,6	41,7	36,4	42,9	40	0
	55-59 ans	43,2	35,8	53,2	33	54,9	83,3	33,3
	60-64 ans	39,8	29,5	50,8	29,1	51,3	33,3	46,2
	65-69 ans	32,2	24,8	41,8	23,1	42,9	41,7	28,6
	70-74 ans	40,7	30,3	52,3	31,3	53	0	42,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>38,8</b>	<b>30,8</b>	<b>48,3</b>	<b>30</b>	<b>49,2</b>	<b>41</b>	<b>37,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,5	7,3	1,4	6,5	1,4	20	0
	55-59 ans	2,7	3,8	1,3	4	1,4	0	0
	60-64 ans	1,5	2,9	0	3,1	0	0	0
	65-69 ans	2,6	2,3	3,1	2,6	2,2	0	14,3
	70-74 ans	2,7	3,4	1,9	3,5	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>3,7</b>	<b>1,4</b>	<b>3,7</b>	<b>1,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	1,2	0	1,3	0	0	0
	55-59 ans	3,8	3,8	3,9	3	2,8	16,7	16,7
	60-64 ans	1,1	0,7	1,5	0,8	0,9	0	7,7
	65-69 ans	4,4	3,1	6,1	3,4	6,6	0	0
	70-74 ans	2,7	3,4	1,9	3,5	1	0	14,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>	<b>8,6</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4,5	7,3	1,4	7,8	1,4	0	0
	55-59 ans	4,4	5,7	2,6	6	2,8	0	0
	60-64 ans	8,2	10,8	5,4	10,2	5,1	16,7	7,7
	65-69 ans	7,5	7,8	7,1	7,7	6,6	8,3	14,3
	70-74 ans	4	4,2	3,7	4,3	4	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>7,3</b>	<b>4,3</b>	<b>7,3</b>	<b>4,2</b>	<b>7,7</b>	<b>5,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,3	15,9	8,3	16,9	8,6	0	0
	55-59 ans	6,6	7,5	5,2	8	5,6	0	0
	60-64 ans	13	15,1	10,8	15,7	12	8,3	0
	65-69 ans	7,5	10,9	3,1	9,4	2,2	25	14,3
	70-74 ans	8,8	10,1	7,5	9,6	7	25	14,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,7</b>	<b>11,8</b>	<b>7,2</b>	<b>11,8</b>	<b>7,3</b>	<b>12,8</b>	<b>5,7</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	2,4	2,8	2,6	2,9	0	0
	55-59 ans	2,7	2,8	2,6	3	2,8	0	0
	60-64 ans	3,3	5	1,5	4,7	1,7	8,3	0
	65-69 ans	6,2	6,2	6,1	6	5,5	8,3	14,3
	70-74 ans	4,9	5	4,7	5,2	4	0	14,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	<b>3,3</b>	<b>5,1</b>	<b>5,7</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0,9	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0,8	0	0,9	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	22,1	18,3	26,4	18,2	25,7	20	50
	55-59 ans	27,9	31,1	23,4	33	21,1	0	50
	60-64 ans	24,2	25,9	22,3	25,2	23,1	33,3	15,4
	65-69 ans	29,5	32,6	25,5	35,9	26,4	0	14,3
	70-74 ans	24,3	31,9	15,9	31,3	16	50	14,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,7</b>	<b>28,5</b>	<b>22,3</b>	<b>29,3</b>	<b>22,3</b>	<b>17,9</b>	<b>22,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	14,3	11	18,1	10,4	17,1	20	50
	55-59 ans	8,2	8,5	7,8	9	8,5	0	0
	60-64 ans	8,9	10,1	7,7	11	6	0	23,1
	65-69 ans	10,1	12,4	7,1	12	7,7	16,7	0
	70-74 ans	11,5	10,9	12,1	10,4	13	25	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,4</b>	<b>10,6</b>	<b>10,1</b>	<b>10,6</b>	<b>10</b>	<b>10,3</b>	<b>11,4</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4,5	1,3	4,9	1,4	0	0
	55-59 ans	2,1	3,4	1,1	3,9	1,2	0	0
	60-64 ans	5	7,3	3,2	7,6	3,4	5,5	1,5
	65-69 ans	3,8	6	2	5,6	1,8	9,3	4,1
	70-74 ans	3,6	4,7	2,7	5	2,8	2,7	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>5,3</b>	<b>2,1</b>	<b>5,5</b>	<b>2,1</b>	<b>3,8</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,5</b>	<b>5,1</b>	<b>2</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3,1	1,1	3,4	1,2	0	0
	55-59 ans	1,3	2	0,7	2,2	0,8	0	0
	60-64 ans	3	4,3	2,1	4,6	2,4	1,8	0
	65-69 ans	1,9	3,5	0,6	3,1	0,4	7	2,1
	70-74 ans	2,5	3,3	1,8	3,4	1,8	2,7	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3</b>	<b>1,3</b>	<b>3,4</b>	<b>1,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>3,2</b>	<b>1,3</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0	0
	55-59 ans	0,5	0,7	0,4	0,8	0,4	0	0
	60-64 ans	0,8	1,4	0,3	1,4	0,3	1,8	0
	65-69 ans	1,6	2	1,2	1,9	1,1	2,3	2,1
	70-74 ans	1,4	1,7	1,1	1,9	1	0	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>	<b>0,6</b>	<b>1,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	0
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	0	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des