

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14880	6421	8459	6294	8064	127	395	
	55-59 ans	14197	6073	8124	5738	7334	335	790	
	60-64 ans	14862	6413	8449	5757	7616	656	833	
	65-69 ans	10457	4802	5655	4301	4636	501	1019	
	70-74 ans	9424	4202	5222	3572	4112	630	1110	
	50-74 ans	63820	27911	35909	25662	31762	2249	4147	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	801	379	422	375	401	4	21	
	55-59 ans	780	332	448	318	419	14	29	
	60-64 ans	876	376	500	364	475	12	25	
	65-69 ans	832	392	440	375	396	17	44	
	70-74 ans	878	389	489	358	439	31	50	
	50-74 ans	4167	1868	2299	1790	2130	78	169	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	552	275	277	273	259	2	18	
	55-59 ans	539	227	312	214	293	13	19	
	60-64 ans	653	283	370	273	349	10	21	
	65-69 ans	603	288	315	276	284	12	31	
	70-74 ans	621	279	342	258	303	21	39	
	50-74 ans	2968	1352	1616	1294	1488	58	128	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	249	104	145	102	142	2	3	
	55-59 ans	241	105	136	104	126	1	10	
	60-64 ans	223	93	130	91	126	2	4	
	65-69 ans	229	104	125	99	112	5	13	
	70-74 ans	257	110	147	100	136	10	11	
	50-74 ans	1199	516	683	496	642	20	41	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	14631	6317	8314	6192	7922	125	392	
	55-59 ans	13956	5968	7988	5634	7208	334	780	
	60-64 ans	14639	6320	8319	5666	7490	654	829	
	65-69 ans	10228	4698	5530	4202	4524	496	1006	
	70-74 ans	9167	4092	5075	3472	3976	620	1099	
	50-74 ans	62621	27395	35226	25166	31120	2229	4106	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	339	166	173	163	167	3	6	
	55-59 ans	357	192	165	180	153	12	12	
	60-64 ans	377	180	197	159	170	21	27	
	65-69 ans	332	174	158	161	133	13	25	
	70-74 ans	281	149	132	128	102	21	30	
	50-74 ans	1686	861	825	791	725	70	100	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	335	163	172	160	166	3	6	
	55-59 ans	353	189	164	177	152	12	12	
	60-64 ans	372	178	194	157	167	21	27	
	65-69 ans	327	171	156	158	131	13	25	
	70-74 ans	268	141	127	121	98	20	29	
	50-74 ans	1655	842	813	773	714	69	99	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	289	140	149	137	144	3	5	
	55-59 ans	324	171	153	160	143	11	10	
	60-64 ans	349	167	182	146	155	21	27	
	65-69 ans	291	151	140	138	117	13	23	
	70-74 ans	246	130	116	110	88	20	28	
	50-74 ans	1499	759	740	691	647	68	93	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	275	133	142	130	137	3	5	
	55-59 ans	311	163	148	152	138	11	10	
	60-64 ans	336	161	175	142	148	19	27	
	65-69 ans	272	144	128	132	107	12	21	
	70-74 ans	233	125	108	105	82	20	26	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1427	726	701	661	612	65	89
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	2	2	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	287	140	147	137	142	3	5
	55-59 ans	320	169	151	158	141	11	10
	60-64 ans	344	164	180	144	153	20	27
	65-69 ans	284	150	134	138	113	12	21
	70-74 ans	244	130	114	110	86	20	28
	50-74 ans	1479	753	726	687	635	66	91
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	5	3	2	2	2	1	0
	65-69 ans	7	1	6	0	4	1	2
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	20	6	14	4	12	2	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	4	1	3	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	289	140	149	137	144	3	5
	55-59 ans	322	171	151	160	141	11	10
	60-64 ans	349	167	182	146	155	21	27
	65-69 ans	290	150	140	138	117	12	23
	70-74 ans	246	130	116	110	88	20	28
	50-74 ans	1496	758	738	691	645	67	93
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	289	140	149	137	144	3	5
	55-59 ans	325	172	153	161	143	11	10
	60-64 ans	351	169	182	148	155	21	27
	65-69 ans	291	151	140	138	117	13	23
	70-74 ans	248	131	117	110	88	21	29
	50-74 ans	1504	763	741	694	647	69	94
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	176	75	101	74	98	1	3
	55-59 ans	163	64	99	60	91	4	8
	60-64 ans	172	62	110	54	92	8	18
	65-69 ans	142	63	79	59	64	4	15
	70-74 ans	116	48	68	40	53	8	15
	50-74 ans	769	312	457	287	398	25	59
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	18	10	8	10	7	0	1
	55-59 ans	23	15	8	14	8	1	0
	60-64 ans	17	8	9	5	7	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	16	10	6	10	6	0	0
	70-74 ans	11	3	8	3	5	0	3
	50-74 ans	85	46	39	42	33	4	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	8	4	4	4	4	0	0
	55-59 ans	13	9	4	9	4	0	0
	60-64 ans	7	2	5	2	4	0	1
	65-69 ans	3	0	3	0	3	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	33	17	16	16	15	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	29	16	13	15	13	1	0
	55-59 ans	47	30	17	27	16	3	1
	60-64 ans	46	24	22	21	19	3	3
	65-69 ans	44	24	20	22	14	2	6
	70-74 ans	35	22	13	21	7	1	6
	50-74 ans	201	116	85	106	69	10	16
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	46	28	18	27	17	1	1
	55-59 ans	61	42	19	39	18	3	1
	60-64 ans	81	52	29	46	26	6	3
	65-69 ans	55	30	25	27	23	3	2
	70-74 ans	51	35	16	28	15	7	1
	50-74 ans	294	187	107	167	99	20	8
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
	55-59 ans	12	7	5	7	5	0	0
	60-64 ans	26	19	7	19	7	0	0
	65-69 ans	25	20	5	16	5	4	0
	70-74 ans	28	19	9	16	6	3	3
	50-74 ans	99	70	29	63	26	7	3
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	10	7	3	6	3	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	7	4	3	4	3	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	4	2	3	1	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	75	44	31	42	30	2	1
	55-59 ans	108	72	36	66	34	6	2
	60-64 ans	127	76	51	67	45	9	6
	65-69 ans	99	54	45	49	37	5	8
	70-74 ans	86	57	29	49	22	8	7
	50-74 ans	495	303	192	273	168	30	24
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	46	28	18	27	17	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	61	42	19	39	18	3	1
	60-64 ans	81	52	29	46	26	6	3
	65-69 ans	55	30	25	27	23	3	2
	70-74 ans	51	35	16	28	15	7	1
	50-74 ans	294	187	107	167	99	20	8
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
	55-59 ans	12	7	5	7	5	0	0
	60-64 ans	26	19	7	19	7	0	0
	65-69 ans	25	20	5	16	5	4	0
	70-74 ans	28	19	9	16	6	3	3
	50-74 ans	99	70	29	63	26	7	3
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
	55-59 ans	10	6	4	6	4	0	0
	60-64 ans	24	17	7	17	7	0	0
	65-69 ans	23	19	4	15	4	4	0
	70-74 ans	27	18	9	15	6	3	3
	50-74 ans	92	65	27	58	24	7	3
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
	55-59 ans	10	6	4	6	4	0	0
	60-64 ans	24	17	7	17	7	0	0
	65-69 ans	22	18	4	14	4	4	0
	70-74 ans	25	16	9	13	6	3	3
	50-74 ans	89	62	27	55	24	7	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	6	2	4	2	4	0	0
	60-64 ans	16	10	6	10	6	0	0
	65-69 ans	15	13	2	10	2	3	0
	70-74 ans	15	10	5	8	4	2	1
	50-74 ans	58	39	19	34	18	5	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	4	0	4	0	0	0
	60-64 ans	8	7	1	7	1	0	0
	65-69 ans	7	5	2	4	2	1	0
	70-74 ans	10	6	4	5	2	1	2
	50-74 ans	31	23	8	21	6	2	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	3	0	0
	60-64 ans	6	5	1	5	1	0	0
	65-69 ans	10	10	0	9	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	24	19	5	18	5	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	2	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	10	5	5	4	5	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	7	5	2	4	2	1	0	0
	50-74 ans	15	10	5	9	5	1	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	5	2	3	1	2	1	1	1
	50-74 ans	9	5	4	3	3	2	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0	0
	55-59 ans	10	6	4	6	4	0	0	0
	60-64 ans	24	17	7	17	7	0	0	0
	65-69 ans	23	19	4	15	4	4	0	0
	70-74 ans	26	17	9	14	6	3	3	3
	50-74 ans	91	64	27	57	24	7	3	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	30	15	15	15	15	0	0	0
	55-59 ans	22	15	7	15	7	0	0	0
	60-64 ans	17	9	8	9	8	0	0	0
	65-69 ans	25	14	11	14	11	0	0	0
	70-74 ans	13	8	5	8	5	0	0	0
	50-74 ans	107	61	46	61	46	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	5,9	5	6	5	3,1	5,3	
	55-59 ans	5,5	5,5	5,5	5,5	4,2	3,7		
	60-64 ans	5,9	5,9	6,3	6,2	1,8	3		
	65-69 ans	8	8,2	7,8	8,7	8,5	3,4	4,3	
	70-74 ans	9,3	9,3	9,4	10	10,7	4,9	4,5	
	50-74 ans	6,5	6,7	6,4	7	6,7	3,5	4,1	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,6	1,7	1,6	1,8	1,6	0,8	
	55-59 ans	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	0,3	1,3	
	60-64 ans	1,5	1,5	1,5	1,6	1,7	0,3	0,5	
	65-69 ans	2,2	2,2	2,2	2,3	2,4	1	1,3	
	70-74 ans	2,7	2,6	2,8	2,8	3,3	1,6	1	
	50-74 ans	1,9	1,8	1,9	1,9	2	0,9	1	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,9	72,6	65,6	72,8	64,6	50	85,7	
	55-59 ans	69,1	68,4	69,6	67,3	69,9	92,9	65,5	
	60-64 ans	74,5	75,3	74	75	73,5	83,3	84	
	65-69 ans	72,5	73,5	71,6	73,6	71,7	70,6	70,5	
	70-74 ans	70,7	71,7	69,9	72,1	69	67,7	78	
	50-74 ans	71,2	72,4	70,3	72,3	69,9	74,4	75,7	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,6	2,1	2,6	2,1	2,4	1,5	
	55-59 ans	2,6	3,2	2,1	3,2	2,1	3,6	1,5	
	60-64 ans	2,6	2,8	2,4	2,8	2,3	3,2	3,3	
	65-69 ans	3,2	3,7	2,9	3,8	2,9	2,6	2,5	
	70-74 ans	3,1	3,6	2,6	3,7	2,6	3,4	2,7	
	50-74 ans	2,7	3,1	2,3	3,1	2,3	3,1	2,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	98,2	99,4	98,2	99,4	100	100	
	55-59 ans	98,9	98,4	99,4	98,3	99,3	100	100	
	60-64 ans	98,7	98,9	98,5	98,7	98,2	100	100	
	65-69 ans	98,5	98,3	98,7	98,1	98,5	100	100	
	70-74 ans	95,4	94,6	96,2	94,5	96,1	95,2	96,7	
	50-74 ans	98,2	97,8	98,5	97,7	98,5	98,6	99	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,3	85,9	86,6	85,6	86,7	100	83,3	
	55-59 ans	91,8	90,5	93,3	90,4	94,1	91,7	83,3	
	60-64 ans	93,8	93,8	93,8	93	92,8	100	100	
	65-69 ans	89	88,3	89,7	87,3	89,3	100	92	
	70-74 ans	91,8	92,2	91,3	90,9	89,8	100	96,6	
	50-74 ans	90,6	90,1	91	89,4	90,6	98,6	93,9	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,2	95	95,3	94,9	95,1	100	100	
	55-59 ans	96	95,3	96,7	95	96,5	100	100	
	60-64 ans	96,3	96,4	96,2	97,3	95,5	90,5	100	
	65-69 ans	93,5	95,4	91,4	95,7	91,5	92,3	91,3	
	70-74 ans	94,7	96,2	93,1	95,5	93,2	100	92,9	
	50-74 ans	95,2	95,7	94,7	95,7	94,6	95,6	95,7	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78	77	80	77	81	67	46	
	55-59 ans	88	89	86	92	87	58	74	
	60-64 ans	77	72	81	72	81	69	83	
	65-69 ans	89	86	93	86	100	78	55	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	101	103	100	106	109	87	70
	50-74 ans	86	85	87	86	90	74	69
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,8	9	8,7	9,2	9	0	0
	55-59 ans	6,2	7,8	4,2	8,3	4,6	0	0
	60-64 ans	4,5	5	4,1	5,7	4,7	0	0
	65-69 ans	7,5	8	7	8,7	8,3	0	0
	70-74 ans	4,6	5,4	3,8	6,3	4,9	0	0
	50-74 ans	6,3	7,1	5,6	7,7	6,3	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,4	100	98,7	100	98,6	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,7	99,3	100	100	100	92,3	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,8	99,9	99,7	100	99,7	98,5	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,9	53,6	67,8	54	68,1	33,3	60
	55-59 ans	50,2	37,2	64,7	37,3	63,6	36,4	80
	60-64 ans	49	36,7	60,4	36,5	59,4	38,1	66,7
	65-69 ans	48,8	41,7	56,4	42,8	54,7	30,8	65,2
	70-74 ans	46,8	36,6	58,1	36,4	60,2	38,1	51,7
	50-74 ans	51,1	40,9	61,7	41,4	61,5	36,2	62,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,2	7,1	5,4	7,3	4,9	0	20
	55-59 ans	7,1	8,7	5,2	8,7	5,6	9,1	0
	60-64 ans	4,8	4,7	4,9	3,4	4,5	14,3	7,4
	65-69 ans	5,5	6,6	4,3	7,2	5,1	0	0
	70-74 ans	4,4	2,3	6,8	2,7	5,7	0	10,3
	50-74 ans	5,7	6	5,3	6,1	5,1	5,8	6,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,8	2,9	2,7	2,9	2,8	0	0
	55-59 ans	4	5,2	2,6	5,6	2,8	0	0
	60-64 ans	2	1,2	2,7	1,4	2,6	0	3,7
	65-69 ans	1	0	2,1	0	2,6	0	0
	70-74 ans	0,8	1,5	0	0,9	0	4,8	0
	50-74 ans	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	1,4	1,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	11,4	8,7	10,9	9	33,3	0
	55-59 ans	14,5	17,4	11,1	16,8	11,2	27,3	10
	60-64 ans	13,1	14,2	12,1	14,2	12,3	14,3	11,1
	65-69 ans	15,1	15,9	14,3	15,9	12	15,4	26,1
	70-74 ans	14,1	16,8	11,1	19,1	8	4,8	20,7
	50-74 ans	13,4	15,2	11,5	15,3	10,7	14,5	17
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,9	20	12,1	19,7	11,8	33,3	20
	55-59 ans	18,8	24,4	12,4	24,2	12,6	27,3	10
	60-64 ans	23,1	30,8	15,9	31,1	16,8	28,6	11,1
	65-69 ans	18,9	19,9	17,9	19,6	19,7	23,1	8,7
	70-74 ans	20,6	26,7	13,7	25,5	17	33,3	3,4
	50-74 ans	19,5	24,5	14,4	24,1	15,3	29	8,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,8	3,6	2	3,6	2,1	0	0
	55-59 ans	3,7	4,1	3,3	4,3	3,5	0	0
	60-64 ans	7,4	11,2	3,8	12,8	4,5	0	0
	65-69 ans	8,6	13,2	3,6	11,6	4,3	30,8	0
	70-74 ans	11,3	14,5	7,7	14,5	6,8	14,3	10,3
	50-74 ans	6,6	9,2	3,9	9,1	4	10,1	3,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0,7	0	0,7	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1,7	0	1,9	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,6	0	0	0	4,8	0
	65-69 ans	1,4	1,3	1,4	1,4	1,7	0	0
	70-74 ans	0,4	0	0,9	0	1,1	0	0
	50-74 ans	0,7	0,9	0,4	0,9	0,5	1,4	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0,7	1,3	0,7	1,4	0	0
	55-59 ans	0,3	0,6	0	0,6	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0,7	0	0,7	0	0	0
	70-74 ans	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	0	0
	50-74 ans	0,5	0,5	0,4	0,6	0,5	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0	0
	60-64 ans	0,3	0,6	0	0,7	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0,7	0	0,7	0	0	0
	70-74 ans	0,8	0,8	0,9	0	0	4,8	3,4
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	0,4	0,2	1,4	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	7	3,7	6,8	3,8	16	2,6
	55-59 ans	7,7	12,1	4,5	11,7	4,7	18	2,6
	60-64 ans	8,7	12	6,1	11,8	6	13,8	7,2
	65-69 ans	9,7	11,5	8,1	11,7	8,2	10,1	8
	70-74 ans	9,4	13,9	5,7	14,1	5,5	12,9	6,4
	50-74 ans	7,9	11,1	5,5	10,8	5,4	13,5	5,8
	50-74 ans **	8	10,9	5,4
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,4	2,2	4,4	2,1	8	2,6
	55-59 ans	4,4	7	2,4	6,9	2,5	9	1,3
	60-64 ans	5,5	8,2	3,5	8,1	3,5	9,2	3,6
	65-69 ans	5,4	6,4	4,5	6,4	5,1	6	2
	70-74 ans	5,6	8,6	3,2	8,1	3,8	11,3	0,9
	50-74 ans	4,7	6,8	3	6,6	3,2	9	1,9
	50-74 ans **	4,8	6,7	3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,4	0,8	0,4	0	0
	55-59 ans	0,9	1,2	0,6	1,2	0,7	0	0
	60-64 ans	1,8	3	0,8	3,4	0,9	0	0
	65-69 ans	2,4	4,3	0,9	3,8	1,1	8,1	0
	70-74 ans	3,1	4,6	1,8	4,6	1,5	4,8	2,7
	50-74 ans	1,6	2,6	0,8	2,5	0,8	3,1	0,7
	50-74 ans **	1,6	2,4	0,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4,3	5,3	0	6,7	0	0	0
	70-74 ans	7,4	11,1	0	13,3	0	0	0
	50-74 ans	3,3	4,6	0	5,2	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des