

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	23565	11240	12325	9839	10712	1401	1613
	55-59 ans	23236	10820	12416	8030	8945	2790	3471
	60-64 ans	19646	9255	10391	6259	6818	2996	3573
	65-69 ans	14825	7006	7819	4502	5056	2504	2763
	70-74 ans	13809	6150	7659	3853	4881	2297	2778
	<b>50-74 ans</b>	<b>95081</b>	<b>44471</b>	<b>50610</b>	<b>32483</b>	<b>36412</b>	<b>11988</b>	<b>14198</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1120	539	581	460	480	79	101
	55-59 ans	1091	489	602	331	413	158	189
	60-64 ans	1042	493	549	336	358	157	191
	65-69 ans	870	415	455	272	291	143	164
	70-74 ans	858	347	511	223	328	124	183
	<b>50-74 ans</b>	<b>4981</b>	<b>2283</b>	<b>2698</b>	<b>1622</b>	<b>1870</b>	<b>661</b>	<b>828</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	728	365	363	311	295	54	68
	55-59 ans	746	332	414	216	269	116	145
	60-64 ans	692	329	363	215	229	114	134
	65-69 ans	616	295	321	186	195	109	126
	70-74 ans	584	218	366	131	223	87	143
	<b>50-74 ans</b>	<b>3366</b>	<b>1539</b>	<b>1827</b>	<b>1059</b>	<b>1211</b>	<b>480</b>	<b>616</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	392	174	218	149	185	25	33
	55-59 ans	345	157	188	115	144	42	44
	60-64 ans	350	164	186	121	129	43	57
	65-69 ans	254	120	134	86	96	34	38
	70-74 ans	274	129	145	92	105	37	40
	<b>50-74 ans</b>	<b>1615</b>	<b>744</b>	<b>871</b>	<b>563</b>	<b>659</b>	<b>181</b>	<b>212</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	23173	11066	12107	9690	10527	1376	1580
	55-59 ans	22891	10663	12228	7915	8801	2748	3427
	60-64 ans	19296	9091	10205	6138	6689	2953	3516
	65-69 ans	14571	6886	7685	4416	4960	2470	2725
	70-74 ans	13535	6021	7514	3761	4776	2260	2738
	<b>50-74 ans</b>	<b>93466</b>	<b>43727</b>	<b>49739</b>	<b>31920</b>	<b>35753</b>	<b>11807</b>	<b>13986</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	423	252	171	220	157	32	14
	55-59 ans	475	290	185	229	139	61	46
	60-64 ans	501	287	214	213	145	74	69
	65-69 ans	416	232	184	162	142	70	42
	70-74 ans	391	221	170	154	128	67	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>2206</b>	<b>1282</b>	<b>924</b>	<b>978</b>	<b>711</b>	<b>304</b>	<b>213</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	417	250	167	218	153	32	14
	55-59 ans	459	284	175	224	130	60	45
	60-64 ans	490	281	209	209	141	72	68
	65-69 ans	402	222	180	153	138	69	42
	70-74 ans	371	205	166	143	125	62	41
	<b>50-74 ans</b>	<b>2139</b>	<b>1242</b>	<b>897</b>	<b>947</b>	<b>687</b>	<b>295</b>	<b>210</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	379	227	152	198	138	29	14
	55-59 ans	421	260	161	207	121	53	40
	60-64 ans	454	262	192	193	131	69	61
	65-69 ans	365	210	155	144	119	66	36
	70-74 ans	345	193	152	134	114	59	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>1964</b>	<b>1152</b>	<b>812</b>	<b>876</b>	<b>623</b>	<b>276</b>	<b>189</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	370	224	146	195	132	29	14
	55-59 ans	411	251	160	199	120	52	40
	60-64 ans	435	249	186	183	126	66	60
	65-69 ans	357	204	153	142	117	62	36
	70-74 ans	328	183	145	125	109	58	36

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>1901</b>	<b>1111</b>	<b>790</b>	<b>844</b>	<b>604</b>	<b>267</b>	<b>186</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	4	4	0	4	0	0	0
	55-59 ans	9	7	2	5	2	2	0
	60-64 ans	8	6	2	4	2	2	0
	65-69 ans	8	6	2	4	1	2	1
	70-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	373	222	151	194	137	28	14
	55-59 ans	415	256	159	203	119	53	40
	60-64 ans	442	256	186	188	125	68	61
	65-69 ans	356	206	150	142	114	64	36
	70-74 ans	336	189	147	130	110	59	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>1922</b>	<b>1129</b>	<b>793</b>	<b>857</b>	<b>605</b>	<b>272</b>	<b>188</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0
	60-64 ans	12	6	6	5	6	1	0
	65-69 ans	9	4	5	2	5	2	0
	70-74 ans	9	4	5	4	4	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	379	227	152	198	138	29	14
	55-59 ans	421	260	161	207	121	53	40
	60-64 ans	454	262	192	193	131	69	61
	65-69 ans	365	210	155	144	119	66	36
	70-74 ans	345	193	152	134	114	59	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>1964</b>	<b>1152</b>	<b>812</b>	<b>876</b>	<b>623</b>	<b>276</b>	<b>189</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	379	227	152	198	138	29	14
	55-59 ans	422	261	161	208	121	53	40
	60-64 ans	455	262	193	193	132	69	61
	65-69 ans	366	210	156	144	120	66	36
	70-74 ans	345	193	152	134	114	59	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>1967</b>	<b>1153</b>	<b>814</b>	<b>877</b>	<b>625</b>	<b>276</b>	<b>189</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	222	110	112	91	102	19	10
	55-59 ans	192	97	95	76	70	21	25
	60-64 ans	202	90	112	62	67	28	45
	65-69 ans	149	60	89	43	63	17	26
	70-74 ans	125	57	68	36	48	21	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>890</b>	<b>414</b>	<b>476</b>	<b>308</b>	<b>350</b>	<b>106</b>	<b>126</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	33	24	9	21	7	3	2
	55-59 ans	33	19	14	13	8	6	6
	60-64 ans	22	14	8	10	5	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	20	12	8	5	7	7	1
	70-74 ans	12	5	7	3	7	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>120</b>	<b>74</b>	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>12</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	47	37	10	34	9	3	1
	55-59 ans	63	49	14	38	13	11	1
	60-64 ans	85	59	26	42	17	17	9
	65-69 ans	57	37	20	25	18	12	2
	70-74 ans	58	36	22	26	11	10	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>310</b>	<b>218</b>	<b>92</b>	<b>165</b>	<b>68</b>	<b>53</b>	<b>24</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	50	38	12	34	12	4	0
	55-59 ans	82	62	20	52	18	10	2
	60-64 ans	103	69	34	53	31	16	3
	65-69 ans	95	67	28	46	24	21	4
	70-74 ans	91	57	34	41	29	16	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>421</b>	<b>293</b>	<b>128</b>	<b>226</b>	<b>114</b>	<b>67</b>	<b>14</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	17	11	6	11	5	0	1
	55-59 ans	36	24	12	21	9	3	3
	60-64 ans	31	23	8	21	8	2	0
	65-69 ans	38	31	7	22	6	9	1
	70-74 ans	53	35	18	27	17	8	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>175</b>	<b>124</b>	<b>51</b>	<b>102</b>	<b>45</b>	<b>22</b>	<b>6</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	8	6	2	6	2	0	0
	55-59 ans	13	8	5	6	2	2	3
	60-64 ans	12	7	5	5	4	2	1
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	5	2	3	1	2	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	97	75	22	68	21	7	1
	55-59 ans	145	111	34	90	31	21	3
	60-64 ans	188	128	60	95	48	33	12
	65-69 ans	152	104	48	71	42	33	6
	70-74 ans	149	93	56	67	40	26	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>731</b>	<b>511</b>	<b>220</b>	<b>391</b>	<b>182</b>	<b>120</b>	<b>38</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	50	38	12	34	12	4	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	82	62	20	52	18	10	2
	60-64 ans	103	69	34	53	31	16	3
	65-69 ans	95	67	28	46	24	21	4
	70-74 ans	91	57	34	41	29	16	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>421</b>	<b>293</b>	<b>128</b>	<b>226</b>	<b>114</b>	<b>67</b>	<b>14</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	17	11	6	11	5	0	1
	55-59 ans	36	24	12	21	9	3	3
	60-64 ans	31	23	8	21	8	2	0
	65-69 ans	38	31	7	22	6	9	1
	70-74 ans	53	35	18	27	17	8	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>175</b>	<b>124</b>	<b>51</b>	<b>102</b>	<b>45</b>	<b>22</b>	<b>6</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	17	11	6	11	5	0	1
	55-59 ans	36	24	12	21	9	3	3
	60-64 ans	27	19	8	18	8	1	0
	65-69 ans	32	26	6	20	5	6	1
	70-74 ans	48	33	15	25	14	8	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>160</b>	<b>113</b>	<b>47</b>	<b>95</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>6</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	17	11	6	11	5	0	1
	55-59 ans	36	24	12	21	9	3	3
	60-64 ans	27	19	8	18	8	1	0
	65-69 ans	32	26	6	20	5	6	1
	70-74 ans	48	33	15	25	14	8	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>160</b>	<b>113</b>	<b>47</b>	<b>95</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>6</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	12	7	5	7	4	0	1
	55-59 ans	22	15	7	12	6	3	1
	60-64 ans	23	16	7	16	7	0	0
	65-69 ans	27	21	6	16	5	5	1
	70-74 ans	36	26	10	19	9	7	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>120</b>	<b>85</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>4</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	14	9	5	9	3	0	2
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	5	5	0	4	0	1	0
	70-74 ans	12	7	5	6	5	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	10	7	3	7	2	0	1
	60-64 ans	9	7	2	7	2	0	0
	65-69 ans	11	8	3	6	2	2	1
	70-74 ans	16	12	4	8	4	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	9	8	1	6	1	2	0
	70-74 ans	8	7	1	4	1	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	1	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0	0
	70-74 ans	8	5	3	5	2	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	17	11	6	11	5	0	1	1
	55-59 ans	35	24	11	21	8	3	3	3
	60-64 ans	26	18	8	17	8	1	0	0
	65-69 ans	31	25	6	19	5	6	1	1
	70-74 ans	48	33	15	25	14	8	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>157</b>	<b>111</b>	<b>46</b>	<b>93</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	23	13	10	12	10	1	0	0
	55-59 ans	21	12	9	11	7	1	2	2
	60-64 ans	18	11	7	11	7	0	0	0
	65-69 ans	13	4	9	4	7	0	2	2
	70-74 ans	8	5	3	5	3	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,8	4,8	4,7	4,7	4,5	5,6	6,3	
	55-59 ans	4,7	4,5	4,8	4,1	4,6	5,7	5,4	
	60-64 ans	5,3	5,3	5,3	5,4	5,3	5,2	5,3	
	65-69 ans	5,9	5,9	5,8	6	5,8	5,7	5,9	
	70-74 ans	6,2	5,6	6,7	5,8	6,7	5,4	6,6	
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5</b>	<b>5,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,8</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,5	1,8	1,5	1,7	1,8	2	
	55-59 ans	1,5	1,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,3	
	60-64 ans	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,4	1,6	
	65-69 ans	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,4	1,4	
	70-74 ans	2	2,1	1,9	2,4	2,2	1,6	1,4	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65	67,7	62,5	67,6	61,5	68,4	67,3	
	55-59 ans	68,4	67,9	68,8	65,3	65,1	73,4	76,7	
	60-64 ans	66,4	66,7	66,1	64	64	72,6	70,2	
	65-69 ans	70,8	71,1	70,5	68,4	67	76,2	76,8	
	70-74 ans	68,1	62,8	71,6	58,7	68	70,2	78,1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>67,6</b>	<b>67,4</b>	<b>67,7</b>	<b>65,3</b>	<b>64,8</b>	<b>72,6</b>	<b>74,4</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,3	1,4	2,3	1,5	2,3	0,9	
	55-59 ans	2,1	2,7	1,5	2,9	1,6	2,2	1,3	
	60-64 ans	2,6	3,2	2,1	3,5	2,2	2,5	2	
	65-69 ans	2,9	3,4	2,4	3,7	2,9	2,8	1,5	
	70-74 ans	2,9	3,7	2,3	4,1	2,7	3	1,5	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>1,9</b>	<b>3,1</b>	<b>2</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	99,2	97,7	99,1	97,5	100	100	
	55-59 ans	96,6	97,9	94,6	97,8	93,5	98,4	97,8	
	60-64 ans	97,8	97,9	97,7	98,1	97,2	97,3	98,6	
	65-69 ans	96,6	95,7	97,8	94,4	97,2	98,6	100	
	70-74 ans	94,9	92,8	97,6	92,9	97,7	92,5	97,6	
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>96,9</b>	<b>97,1</b>	<b>96,8</b>	<b>96,6</b>	<b>97</b>	<b>98,6</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,9	90,8	91	90,8	90,2	90,6	100	
	55-59 ans	91,7	91,5	92	92,4	93,1	88,3	88,9	
	60-64 ans	92,7	93,2	91,9	92,3	92,9	95,8	89,7	
	65-69 ans	90,8	94,6	86,1	94,1	86,2	95,7	85,7	
	70-74 ans	93	94,1	91,6	93,7	91,2	95,2	92,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,8</b>	<b>92,8</b>	<b>90,5</b>	<b>92,5</b>	<b>90,7</b>	<b>93,6</b>	<b>90</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,6	98,7	96,1	98,5	95,7	100	100	
	55-59 ans	97,6	96,5	99,4	96,1	99,2	98,1	100	
	60-64 ans	95,8	95	96,9	94,8	96,2	95,7	98,4	
	65-69 ans	97,8	97,1	98,7	98,6	98,3	93,9	100	
	70-74 ans	95,1	94,8	95,4	93,3	95,6	98,3	94,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,8</b>	<b>96,4</b>	<b>97,3</b>	<b>96,3</b>	<b>97</b>	<b>96,7</b>	<b>98,4</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85	86	83	90	83	60	90	
	55-59 ans	80	84	74	90	80	63	54	
	60-64 ans	79	82	76	89	72	62	84	
	65-69 ans	80	79	81	84	78	68	91	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	85	86	84	94	94	68	54
	<b>50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>89</b>	<b>81</b>	<b>65</b>	<b>73</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,4	5,2	5,8	5,5	6,4	3,1	0
	55-59 ans	4,4	4,1	4,9	4,8	5	1,6	4,3
	60-64 ans	3,6	3,8	3,3	5,2	4,8	0	0
	65-69 ans	3,1	1,7	4,9	2,5	4,9	0	4,8
	70-74 ans	2	2,3	1,8	3,2	2,3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>4,1</b>	<b>4,4</b>	<b>4,8</b>	<b>0,7</b>	<b>1,9</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,6	48,5	73,7	46	73,9	65,5	71,4
	55-59 ans	45,5	37,2	59	36,5	57,9	39,6	62,5
	60-64 ans	44,4	34,4	58	32,1	50,8	40,6	73,8
	65-69 ans	40,7	28,6	57,1	29,9	52,5	25,8	72,2
	70-74 ans	36,2	29,5	44,7	26,9	42,1	35,6	52,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>45,2</b>	<b>35,9</b>	<b>58,5</b>	<b>35,1</b>	<b>56</b>	<b>38,4</b>	<b>66,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,7	10,6	5,9	10,6	5,1	10,3	14,3
	55-59 ans	7,8	7,3	8,7	6,3	6,6	11,3	15
	60-64 ans	4,8	5,3	4,1	5,2	3,8	5,8	4,9
	65-69 ans	5,5	5,7	5,1	3,5	5,8	10,6	2,8
	70-74 ans	3,5	2,6	4,6	2,2	6,1	3,4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>	<b>5,7</b>	<b>5,9</b>	<b>5,4</b>	<b>8</b>	<b>6,3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,4	0,7	0,5	0,7	0	0
	55-59 ans	0,2	0,4	0	0,5	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,5	1	0	1,4	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,4	16,3	6,6	17,2	6,5	10,3	7,1
	55-59 ans	14,9	18,8	8,7	18,3	10,7	20,8	2,5
	60-64 ans	18,7	22,5	13,5	21,8	12,9	24,6	14,8
	65-69 ans	15,6	17,6	12,8	17,4	15	18,2	5,6
	70-74 ans	16,8	18,7	14,5	19,4	9,6	16,9	28,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,8</b>	<b>18,9</b>	<b>11,3</b>	<b>18,8</b>	<b>10,9</b>	<b>19,2</b>	<b>12,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,2	16,7	7,9	17,2	8,7	13,8	0
	55-59 ans	19,4	23,8	12,4	25	14,9	18,9	5
	60-64 ans	22,6	26,3	17,6	27,5	23,5	23,2	4,9
	65-69 ans	26	31,9	17,9	31,9	20	31,8	11,1
	70-74 ans	26,4	29,5	22,4	30,6	25,4	27,1	13,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,4</b>	<b>25,4</b>	<b>15,7</b>	<b>25,8</b>	<b>18,2</b>	<b>24,3</b>	<b>7,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	4,8	3,9	5,6	3,6	0	7,1
	55-59 ans	8,5	9,2	7,5	10,1	7,4	5,7	7,5
	60-64 ans	6,8	8,8	4,1	10,9	6,1	2,9	0
	65-69 ans	10,4	14,8	4,5	15,3	5	13,6	2,8
	70-74 ans	15,4	18,1	11,8	20,1	14,9	13,6	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,9</b>	<b>10,8</b>	<b>6,3</b>	<b>11,6</b>	<b>7,2</b>	<b>8</b>	<b>3,2</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,1	2,6	1,3	3	1,4	0	0
	55-59 ans	3,1	3,1	3,1	2,9	1,7	3,8	7,5
	60-64 ans	2,6	2,7	2,6	2,6	3	2,9	1,6
	65-69 ans	1,1	0,5	1,9	0,7	0,8	0	5,6
	70-74 ans	1,4	1	2	0,7	1,8	1,7	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>3,7</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0,4	0,6	0,5	0,8	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0	0,6	0	0,8	0	0
	70-74 ans	0,3	0,5	0	0	0	1,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	6,8	1,8	7	2	5,1	0,6
	55-59 ans	6,3	10,4	2,8	11,4	3,5	7,6	0,9
	60-64 ans	9,7	14,1	5,9	15,5	7,2	11,2	3,4
	65-69 ans	10,4	15,1	6,2	16,1	8,5	13,4	2,2
	70-74 ans	11	15,4	7,5	17,8	8,4	11,5	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,8</b>	<b>11,7</b>	<b>4,4</b>	<b>12,2</b>	<b>5,1</b>	<b>10,2</b>	<b>2,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,9</b>	<b>11,7</b>	<b>4,4</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,4	1	3,5	1,1	2,9	0
	55-59 ans	3,6	5,8	1,6	6,6	2	3,6	0,6
	60-64 ans	5,3	7,6	3,3	8,6	4,6	5,4	0,9
	65-69 ans	6,5	9,7	3,6	10,4	4,8	8,5	1,5
	70-74 ans	6,7	9,5	4,5	10,9	6,1	7,1	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>6,7</b>	<b>2,6</b>	<b>7,1</b>	<b>3,2</b>	<b>5,7</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,5</b>	<b>6,7</b>	<b>2,6</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1	0,5	1,1	0,5	0	0,6
	55-59 ans	1,6	2,3	1	2,7	1	1,1	0,9
	60-64 ans	1,6	2,5	0,8	3,4	1,2	0,7	0
	65-69 ans	2,6	4,5	0,9	5	1,2	3,6	0,4
	70-74 ans	3,9	5,8	2,4	7,2	3,6	3,5	0,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>2,8</b>	<b>1</b>	<b>3,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,9</b>	<b>2,8</b>	<b>1</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des