

Tableau 6. Déterminants cognitifs et affectifs associés à l'anxiété, la dépression, aux problèmes de sommeil et aux pensées suicidaires (associations ; données pondérées)  
 Source : Enquête CoviPrev, France métropolitaine, 2020-2021

	Anxiété (score > 10 sur l'échelle HAD <sup>1</sup> )								Dépression (score > 10 sur l'échelle HAD <sup>1</sup> )								Problèmes de sommeil (au cours des 8 derniers jours)								Pensées suicidaires (au cours des 12 derniers mois)													
	4-6 nov. 2020	23-25 nov. 2020	18-20 janv. 2021	15-17 fév. 2021	15-17 mars 2021	21-23 avril 2021	17-19 mai 2021	28 sept.- 5 oct. 2021	4-6 nov. 2020	23-25 nov. 2020	18-20 janv. 2021	15-17 fév. 2021	15-17 mars 2021	21-23 avril 2021	17-19 mai 2021	28 sept.- 5 oct. 2021	4-6 nov. 2020	23-25 nov. 2020	18-20 janv. 2021	15-17 fév. 2021	15-17 mars 2021	21-23 avril 2021	17-19 mai 2021	28 sept.- 5 oct. 2021	15-17 fév. 2021	15-17 mars 2021	21-23 avril 2021	17-19 mai 2021	28 sept.- 5 oct. 2021									
Période de recueil des données	V17	V18	V20	V21	V22	V23	V24	V28	V17	V18	V20	V21	V22	V23	V24	V28	V17	V18	V20	V21	V22	V23	V24	V28	V21	V22	V23	V24	V28									
Numéro de vague d'enquête	2000								2000								2000								2000													
Nombre de personnes interrogées	2000								2000								2000								2000													
<b>Déterminants cognitifs</b>																																						
Mesures de prévention perçues comme peu efficaces	***	***							***	**							--	***																				
Mesures de prévention perçues comme contraignantes	***	***							***	***							--	***	*																			
Moindre approbation et adoption des mesures de prévention par les proches (norme sociale perçue)	--	--							**	--							**	--																				
Se sentir peu capable d'adopter les mesures de prévention	--	**							--	*							--	--																				
Percevoir la COVID-19 comme grave	***	***							*	--							***	**																				
Se sentir vulnérable au risque d'infection par le Coronavirus (SARS-CoV-2)	**	***							*	***							*	*																				
<b>Déterminants affectifs</b>																																						
Inquiétude à l'égard de la santé	***	***	***	***	***	***	***	Non posés	--	--	--	--	--	--	--	Non posés	***	***	***	***	***	**	--	Non posés	*	*	--	--	Non posés									
Inquiétude à l'égard de la situation économique	**	*	*	*	--	*	--	Non posés	--	--	*	--	--	--	**	Non posés	***	*	--	--	--	--	--	Non posés	--	--	--	--	Non posés									
Frustration	--	--	--	--	--	*	--	Non posés	***	--	--	--	***	***	***	Non posés	--	--	--	--	--	--	--	Non posés	--	--	--	--	Non posés									
Colère	***	***	***	***	***	***	***	Non posés	***	**	--	--	***	***	***	*	*	*	*	*	*	*	*	Non posés	***	***	***	***	Non posés									
Déprime	***	***	***	***	***	***	***	Non posés	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	***	***	***	***	***	***	***	Non posés	***	***	***	***	Non posés									
Solitude	--	--	--	*	**	**	--	*	***	***	***	***	***	***	***	**	--	--	--	--	--	*	--	Non posés	**	**	--	--	Non posés									
Isolement	--	--	--	--	--	--	--	*	--	**	**	*	--	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	Non posés	***	***	***	***	Non posés									
Peur	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	--	--	***	***	***	**	*	--	--	--	**	--	--	--	--	Non posés	--	--	--	--	Non posés									
Impuissance	**	***	--	--	--	*	**	***	**	**	--	**	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Non posés	--	--	--	--	Non posés										

Notes : Evolutions testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d'agglomération et région d'habitation (test de Wald ajusté au seuil de 5%).  
 - Pour chaque vague, l'association entre le facteur cognitif et les indicateurs (anxiété, dépression, sommeil) est testée, après ajustement sur l'ensemble des variables sociodémographiques, des variables liées à la situation épidémique, et des autres facteurs cognitifs (modèles de régression logistique, test de Wald au seuil de .05), \*\*\*: p<0,001 ; \*\*: p<0,01 ; \* : p<0,05 ; -- : association non significative (p>0,05).  
 - Pour chaque vague, l'association entre le facteur affectif et les indicateurs (anxiété, dépression, sommeil, pensées suicidaires) est testée, après ajustement sur l'ensemble des variables sociodémographiques, des variables liées à la situation épidémique, et des autres facteurs affectifs (modèles de régression logistique, test de Wald au seuil de .05), \*\*\*: p<0,001 ; \*\*: p<0,01 ; \* : p<0,05 ; -- : association non significative (p>0,05).  
<sup>1</sup>HAD : Hospital Anxiety and Depression scale.  
 ∅ déterminant affectif non introduit dans le modèle d'analyse.

**Lecture du tableau :**  
 Ex. : En vague 17, l'inquiétude à l'égard de la situation économique était significativement associée aux problèmes de sommeil (p < 0,01), après ajustement sur toutes les autres variables (sociodémographiques, liées à la situation épidémique et affectives).